

## କୃଷି ସୂଚନା ସେବା (ଧାନ)

### ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ.-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

ମେ ମାସ ୧୮ ରୁ ୨୦ ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅମଳ ବାତ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସଚକ୍ତା :

ସହଜ ଅମଳ ନିମନ୍ତେ, ଅମଳ ହୋଇନଥିବା ଧାନ ଶସ୍ୟକୁ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଜମିରହିଥିବା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ । ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବ୍ୟବହାର କରି ଆସନ୍ତା ଖରିଫ ଋତୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।

- ଅମଳ ହୋଇନଥିବା, ବଳକା ଥିବା ଧାନ ଶସ୍ୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରନ୍ତୁ ।
- ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଶସ୍ୟର ଆର୍ଦ୍ରତା ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ରଖି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଷାଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଗଚ୍ଛିତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ବାହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଆର୍ଦ୍ରତା (୧୪ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଦ୍ରତା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ପୁଣିଥରେ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ କରନ୍ତୁ ।
- ମହଜୁଦ୍ ଥିବା ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ପୋକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସଫାଲଡ୍ ବଟିକା ରୁଞ୍ଜ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପିଛା ତିନିଗୋଟି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସଫାଲଡ୍ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ଠାରୁ ଅତିକମ୍ରେ ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଧୂଆଁଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ୍ ।

୨୦୨୦ ମସିହା ମଇ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରା :

- ଧାନ କେଣ୍ଡାରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଶସ୍ୟ ପାକଳ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅମଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଭଲ ଭାବେ ଧାନକୁ ଶୁଖାଇ ଶସ୍ୟର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ହେବା ପରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ବିହନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟର ଆର୍ଦ୍ରତା ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଯେଉଁଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାନ ବୁଣାବୁଣି କରିବାର ଅଛି, ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ରୋଇବା ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।

- ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୁଖା ଧାନ ଚଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
- ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଧଣିଚା ବିହନ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ । ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ରୋଇବାକୁ ଥିଲେ, ଏବେଠାରୁ ଏକର ପିଛା ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ଧଣିଚା ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରି ବୁଣିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ବିଭିନ୍ନ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା କୃଷି ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗଭୀର ଜମିପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଯଥା ବର୍ଷାଧାନ, ଦୁର୍ଗା, ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୧, ଶାରଳା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିହନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ । ଗଭୀର ଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଯଥା ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୦, ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୨ (ଜୟନ୍ତୀ ଧାନ), ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୩ (ଜଳମଣି), ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୫ ଓ ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୭ (ପ୍ରଶାନ୍ତ) ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
- ସେହିପରି ଦ୍ୱିପଜମି ପାଇଁ ସି.ଆର.ଧାନ ୧୦୦ (ସତ୍ୟଭାମା), ସି.ଆର.ଧାନ ୧୦୧ (ଅଙ୍କିତ), ସହଭାଗୀ ଧାନ, ଫାଲଗୁନୀ ଓ ବନ୍ଦନା ଧାନ ବିହନ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ରୋଇବା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ବିହନ ଯଥା : ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୭ (ମଉତମଣି), ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୩, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୪, ଏମ୍.ଟି.ୟୁ ୧୦୦୧, ଏମ୍.ଟି.ୟୁ ୧୦୧୦, ନବୀନ, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୧୦, ଡି.ଆର.ଆର. ୪୪, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ କିସମ, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୧, ସି.ଆର.ଧାନ ୮୦୦, ସି.ଆର.ଧାନ ୪୦୪, ସର୍ତ୍ତ, ପୂଜା, ସର୍ତ୍ତସର୍ ୧ ଏବଂ ବିପିଟି ୫୨୦୪ ବିହନ ଇତ୍ୟାଦି ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କୃଷି ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସରୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
- ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲବଣୟୁକ୍ତ ଜମି ନିମିତ୍ତ ଲବଣ ସହଣୀୟ ଧାନ ବିହନ ଯଥା ସି.ଆର.ଧାନ ୪୦୫ (ଲୁଣାସଂଖୀ), ସି.ଆର.ଧାନ ୪୦୩ (ଲୁଣା ସୁବର୍ଣ୍ଣା) ଏବଂ ଲୁଣିଶ୍ରୀ ବିହନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଳସେଚିତ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ବିହନ ଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଗୁଣାଭାଲମାନେ ଉନ୍ନତମାନର ଗୁଥୁ ଫୁଲ ଲେଉଲ ବିହନ(TL) ଯଥା ଅଜୟ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସି.ଆର.ଧାନ ୭୦୧, କେ.ଆର.ଏର୍-୨ ଏବଂ ପି.ଏର୍.ବି ୭୧ ବିହନ ବିଭିନ୍ନ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହନ ସଂସ୍ଥା/ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

- ବାସ୍ତାଧୀନ ଋଷକରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀଥିବା ଋଷୀଭାଇମାନେ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ କିସମ ଯଥା ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ସି.ଆର.ସୁଗନ୍ଧ ଧାନ ୯୦୭, ସି.ଆର.ସୁଗନ୍ଧ ଧାନ ୯୦୮ ଏବଂ ସି.ଆର.ସୁଗନ୍ଧ ଧାନ ୯୧୦ ଇତ୍ୟାଦି ବିହନ ବନ୍ଦୋବସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ।
- ମହଜୁଦ୍ ଥିବା ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ, ଯଥାଶିକ୍ଷା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସ୍ଫାଲଟ୍ ବଟିକା ରୁଢ଼ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପିଛା ତିନିଗୋଟି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସ୍ଫାଲଟ୍ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ଠାରୁ ଅତିକମ୍ରେ ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । ଆବଶିକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଧୂଆଁଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ୍ ।

\*\*\*\*\*