

ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ‘ବାର୍ଡ଼ ଫୁ’, ‘କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ’, ‘ରାଣୀକ୍ଷେତ୍’, ‘କଲେରା’, ‘ମାଇକୋପ୍ଲାଜମୋସିସ୍’, ‘ମାରେକ୍ସ’, ‘ଗୁୟୋରୋ ବା ଆଇ.ବି.ଡି.’, ‘କକ୍ସିଡ଼ିଓସିସ୍’, ‘ସାଇମୋନେଲୋସିସ୍’ ଆଦି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର



ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ । ଏହାଛଡ଼ା ପାଣିପାଗ ଅଥବା ଖାଦ୍ୟର ତତ୍ତ୍ଵଶାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ପାଣି ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ନ ମିଳିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହୋଇଥାଏ । କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସରେ ଟୀକାକରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବା ସହିତ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।

ଟୀକାକରଣ

ବୟସ	ଟୀକାର ନାମ	ଉପାୟ	ମାତ୍ରା
୫-୭ ଦିନ	ରାନିକ୍ଷେତ୍ (F ₁ /ଲାଇସୋଟା)	ଆଖି/ନାକ ପୁଡ଼ାରେ	ଏକ ବୁନ୍ଦା
୧୪ ଦିନ	ଗୁୟୋରୋ ରୋଗ (ଆଇ.ବି.ଡି.)	ଆଖି ବା ନାକ ପୁଡ଼ାରେ	ଏକ ବୁନ୍ଦା
୨୮ ଦିନ	ରାନିକ୍ଷେତ୍ (F ₁ /ଲାଇସୋଟା)	ଆଖି ବା ନାକ ପୁଡ଼ାରେ	ଏକ ବୁନ୍ଦା
୬ ସପ୍ତାହ	କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ	ଡ଼େଣା ତଳେ	୦.୧-୦.୨ ମି.ଲି.
୮ ସପ୍ତାହ	ପ୍ଲୁମାବୋଗ (ଆରବୁଟି)	ଚମଡ଼ା ତଳେ ବା ମାଂସପେଶୀରେ	୦.୫ ମି.ଲି.
୧୬ ସପ୍ତାହ	ପ୍ଲୁମାବୋଗ (ଆରବୁଟି)	ଚମଡ଼ା ତଳେ ବା ମାଂସପେଶୀରେ	୦.୫ ମି.ଲି.

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରୁ ଲାଭ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୁକୁଡ଼ାପାଳନ କଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ ୨୫ ରୁ ୩୦ ଟି କୁକୁଡ଼ାରୁ ବାର୍ଷିକ ୧୪,୦୦୦ ରୁ ୧୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବ । କୁକୁଡ଼ା ମଲ ଉନ୍ନତ ସାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । କୁକୁଡ଼ା ପାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଥବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୁକୁଟ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ), ଭୁବନେଶ୍ଵରକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରାଣୀଧନ ମିଶନ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ‘ଘର ଅଗଣାରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ’ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ୪୫ଟି ଟିଆଁ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣିପାତ୍ର ଓ ରାତ୍ରି ରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଟ. ୧୫୦୦/- ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଷୟିକ ଇସ୍ତାହାର: ୧୯ (ଜୁଲାଇ ୨୦୧୯)

ସଂପାଦନା: ଡା. ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତ

ସହଯୋଗିତା: ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଲାଇ, ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶୋଇ

ପ୍ରକାଶକ: ଭାରତପ୍ରାସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ

ଭାକୁଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ



E-mail: kvkcuttack@gmail.com Website : www.kvkcuttackzpdvii.org

ଘର ଅଗଣାରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ



ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରଞ୍ଜନ ସତ୍ତ୍ଵୀ, ତୃଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଦେବାଶିଷ ଜେନା



କୁକୁଡ଼ାପାଳନ ଆମର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ । କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ତଥା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଲାଭ ମିଳି ପାରିଥାଏ । ଏହା ବର୍ଷସାରା ସ୍ଥିର ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଥାଏ । କୁକୁଡ଼ା, ଦାନାକୁ ଭଲ ପୁଷିକାର ଖାଦ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । ପ୍ରାଣୀକ ପୁଷିକାର ହିସାବରେ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବହୁଥିବା ପିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ତଥା ବୃଦ୍ଧ ଓ ରୋଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ । ଅତି ପୁରାତନ ସମୟରୁ ଗ୍ରାମାଂଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ରଖି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀକ ପୁଷିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ । ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାସ୍ଥ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ୧୮ ଠି ଅଣ୍ଡା ଓ ହାରାହାରି ୩.୫ କିଲୋ ମାଂସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ପ୍ରକାର ଭେଦ

କୁକୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାର, ଯଥା ଅଣ୍ଡାଦିଆ (କଲିଙ୍ଗ ବ୍ରାଉନ, ହାଇଲ୍ ଲେଗହର୍ଣ୍ଣ), ମାଂସ ଉପଯୋଗୀ (ବୁୟଲର, ଅସିଲ୍, କଡକନାଥ, ବ୍ଲକ୍ ରକ୍) ତଥା ଉଭୟ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ ଉପଯୋଗୀ (ବନରାଜା, ରେନବୋ ରୁଷ୍ଟର, ଆର.ଆଇ.ଆର.) । ଆଗରୁ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ କିଛି ଉନ୍ନତ କୁକୁଡ଼ା ବର୍ଷକୁ ୧୫୦ ରୁ ୨୬୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି । ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ୫-୬ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨ ରୁ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ୩ ମାସ ବୟସରେ ୭୫୦-୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ହେଲା ବେଳେ ଉନ୍ନତ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ୧.୨-୨ କିଲୋ ଓଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘର ଅଗଣାରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ବନରାଜା, ରେନବୋ ରୁଷ୍ଟର, ଅସିଲ୍ ଓ କଡକନାଥ ଉପଯୁକ୍ତ ।



ହାଇଲ୍ ଲେଗହର୍ଣ୍ଣ

କଡକନାଥ

ବନରାଜା

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପଦ୍ଧତି

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଳ୍ପ କୁକୁଡ଼ା ରଖି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନର କୌଶଳ ଜାଣିବା ପରେ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ଦରକାର । ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ କୁକୁଡ଼ା ଅଧିକ ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନର କିଛି ପଦ୍ଧତି:

ବାସଗୃହ: କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଘର ଅଗଣାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ବା ସିମେଣ୍ଟର ନଡ଼ା ବା ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛପରଯୁକ୍ତ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତୁ । କୁକୁଡ଼ା ପିଛା ୧ ରୁ ୨ ବର୍ଗ ଫୁଟ ହିସାବରେ ଚଟାଣ ରଖି ୬ ଫୁଟ ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଛପର କରନ୍ତୁ । ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ବିପରୀତ କାନ୍ଥରେ ୨ଟି ବଡ଼ ଝରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା କୁକୁଡ଼ା ମଳରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ତଥା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ (ଆମୋନିଆ ବାଷ୍ପ) ଦୂର ହୋଇଥାଏ ତଥା ଶୁଦ୍ଧ ପବନ ମିଳିଥାଏ । କୁକୁଡ଼ା ଘର ଓ ତାର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣି କିମ୍ବା ଅନାବନା ଘାସ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁର ଯତ୍ନ: ଦିନକିଆ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହ୍ୟାଚେରୀରୁ ଆଣନ୍ତୁ । ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ୨-୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଜି/ ମକାଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଇଲେକଟ୍ରୋଲାଇଟ୍/ORS ପାଉଡ଼ର ବା ଗୁଡ଼/ଚିନି-ଲୁଣ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଚଟାଣରେ ୨-୪ ଇଞ୍ଚ ବହଳର

ହାଲୁକା ଓ ଶୁଷ୍କ ପଦାର୍ଥ ଯଥା କରତଗୁଣ୍ଡ, ମୋଟା କାଗଜଗୁଣ୍ଡ, କୁଣ୍ଡା ଅଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି (ଲିଟର) ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ଖବରକାଗଜ ପକାଇ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ୨-୩ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଚାରି କଡ଼ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଡ୍‌ବୋର୍ଡ୍ ବା ଚିଣ ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଗୋଲାକାର ଆକାର



କରନ୍ତୁ । ପରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଆଣି ପ୍ରଥମ ୬ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଫାସୁତୁରା ତଥା ରୁନରେ ବିଶୋଧନ କରି ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍‌ବ ଅଥବା ବୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ଦେହର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର । ପ୍ରଥମଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଆଲୋକରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଭଲଭାବରେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟବଧାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ବୁଡ଼ରରେ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲେ ଚିଆଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦରକାରଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ମିଳୁଥିଲେ ଚିଆଁମାନେ ସମଭାବରେ ନ ରହି କେବଳ ବଲ୍‌ବର ତଳ ଭାଗରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତଥା ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ମିଳୁଥିଲେ ଚିଆଁଗୁଡ଼ିକ ବଲ୍‌ବରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି । କାର୍ଡ୍‌ବୋର୍ଡ୍‌ଟି ୨-୩ ସପ୍ତାହ ପରେ କାଢ଼ି ଦେବା ଦରକାର । ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ୩-୪ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ।

ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି: ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ପାତ୍ରରେ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ବଢ଼ିବା ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଗହମ, ମକା, ଚୋକଡ଼, ପିଡ଼ିଆ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଓ ଚୋପା ସହିତ ଧାତୁସାର-ଖଣିଜ ଲବଣ ତଥା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଭଲ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି । ପକ୍ଷୀଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଆଶାନ୍ୱରୁପ ଫଳ ମିଳିଥାଏ । ଛଅ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନା ଉପରେ ନ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ବାହାରେ ଚରିବୁଲି ଖାଇବାକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇପାରିବ । ବାଡ଼ିବଗିଚାର ଚାରିପଟେ ତାରଜାଲି ବା ମଶାରି ଆବନ୍ଧ କରି ଶାଗ, ରୋଷେଇ ଘରର ନଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ପୋକ ଓ ଜିଆ ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଅନ୍ଧଦାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଅଣ୍ଡାଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତୁଷ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନେ ମିଳିଥାଏ ଓ ଅଣ୍ଡାର ଓଜନ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ପଥର ଚୁନ, ଶାମୁକା, ମାଛକାଠି ଅଥବା ମାର୍ବଲ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବାରେ ମିଶାଇଲେ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳ ଟାଣ ହୋଇଥାଏ, ଅଣ୍ଡାର ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଆକାର ବଢ଼ିଥାଏ । ମାଛ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାଦେବା ଆରମ୍ଭକଲେ ୧୦-୧୫ଟି ମାଛ କୁକୁଡ଼ା



ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ରଖି ଅନ୍ୟ ଅଣ୍ଡିରା ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ମାଛ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଥାଏ । ମକା ଥିବା ଦାନା ଅତି ପୁରୁଣା ହେଲେ ଅଥବା ପାଣିରେ ଭିଜି ରହିଲେ ଦାନା ଫିଙ୍ଗି ମାରିଯାଏ ଓ ସେଥିରେ ଆୟୁର୍ବକ୍ତିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଫିଙ୍ଗିମାରିଥିବା ପୁରୁଣା ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେଥିରେ ଥିବା ଆୟୁର୍ବକ୍ତିନ୍ ପକ୍ଷୀଘାତ ରୋଗ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଣ୍ଡାଦେବା ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତି ତଥା ମରିଥାନ୍ତି ।

ରୋଗୀଣା କୁକୁଡ଼ା ଚିହ୍ନିବା କିପରି?

ରୋଗୀଣା କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇ ନ ଥିବ, ଦୁର୍ବଳ ଭଳି ଚାଲୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଥିବ, ଘୁମେଇ ଥିବ, ପର ତଥା ମଳଦ୍ୱାରରେ ମଳ ଲାଗି ରହୁଥିବ ଅଥବା ନାକରୁ ପାଣି ଗଡ଼ୁଥିବ ତା ହେଲେ ରୋଗର କାରଣ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ । ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ଅଥବା ଝାଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ । ଦୁର୍ବଳ ତଥା ରୋଗୀଣା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ ।

ରୋଗ ପରିଚାଳନା

କୁକୁଡ଼ାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୃମିଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରତୁ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ବାଜାଣୁ, ଭୂତାଣୁ ଏବଂ କବକ କୁକୁଡ଼ାକୁ