

ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବଡ଼କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମରିଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗା ରୁ ୪ ମାସ ବୟସର ବଡ଼କମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ୍ ଟୀକା ଦେବା ଦରକାର । 'ଡକ୍ ପ୍ଲେଗ୍' ଯଦିଓ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହୁଏ ତଥା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । 'ଡକ୍ କଲେରା'ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗା ରୁ ୪ ସପ୍ତାହ ବୟସର ବଡ଼କମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବା ଦରକାର ।



ରୋଗାଣା ବଡ଼କର ଲକ୍ଷଣ

ରୋଗାଣା ବଡ଼କ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଉ ନ ଥିବ, ଦୁର୍ବଳ ଭଳି ଚାଲୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଥିବ, ପର ତଥା ମଳଦ୍ୱାରରେ ମଳ ଲାଗି ରହୁଥିବ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ଅଥବା ନାକରୁ ପାଣି ଗଡୁଥିବ ତା ହେଲେ ରୋଗର କାରଣ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ ।

ବଡ଼କ ପାଳନରୁ ଲାଭ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବଡ଼କପାଳନ କଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ୨୫ ରୁ ୩୦ ଟି ବଡ଼କରୁ ବାର୍ଷିକ ୧୪,୦୦୦ ରୁ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବ । ବଡ଼କ ଅଣ୍ଡାର ଓଜନ ୬୦ ରୁ ୭୫ ଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାଠାରୁ ଅଧିକ । ବଡ଼କ ୨ରୁ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି । ବଡ଼କ ନିକଟରେ ଥିବା ଧାନ ବିଲ, ପୋଖରୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣି ଜମିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅନାବନା ଘାସ, କାଟ ପତଙ୍ଗ, ଝିଣ୍ଟିକା, ଗେଣ୍ଡା ତଥା ପତିଥିବା ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଆମର ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି । ବଡ଼କର ପର ଓ ମଳ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଅଗଣାରେ ବଡ଼କ ପାଳିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ

ବଡ଼କ ପାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼କ ପାଳନର କୌଶଳ ପାଇଁ ବଡ଼କ ପାଲୁଥିବା ଚାଷୀ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ (୦୮୭୨୩୨୭୧୦୨୦) କିମ୍ବା ବଡ଼କ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର, ଖପୁରିଆ, କଟକ (୦୨୭୧-୨୩୪୪୦୭୧) ଅଥବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର (୦୨୭୪-୨୬୦୦୬୮୬, ୨୫୬୪୯୫୦) କୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ।



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଷୟିକ ଲଞ୍ଚନା : ୭
 ପୃଷ୍ଠା ବିନ୍ୟାସ : ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଲେଇ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି : ଅରବିନ୍ଦ ବିଶୋଇ
 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ, ସମୁଦ୍ର
ଭାକୁଅନୁପ-କାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ
 ଫୋନ୍ : ୦୨୭୧- ୨୧୧୭୨୫୮, Email : kvkcuttack@gmail.com



ଘର ଅଗଣାରେ ବଡ଼କ ପାଳନ

ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଶିବ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସାଦ, ସୁଜାତା ସେଠୀ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ମନିଷ ଚୌରାସିଆ

ବଡ଼କ ପାଳନ କରିବା କାହିଁକି ?

ବଡ଼କ ପାଳନ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ବଡ଼କମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଅଧିକ । କୁକୁଡ଼ାଠାରୁ ବଡ଼କ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି । ବଡ଼କର ଅଣ୍ଡାର ଆକାର ବଡ଼; ତେଣୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପ୍ରାଣ ଏଥିରୁ ମିଳିଥାଏ । ତେଣୁ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂର କରିବାରେ ବଡ଼କ ପାଳନ ଏକ ମୂଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

ବଡ଼କର ପ୍ରକାର ଭେଦ

ବଡ଼କ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଅଣ୍ଡାଦିଆ (ଖାକି କ୍ୟାମ୍ପବେଲ, ଦେଶୀ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରନ୍ନର) ଓ ମାଂସ ଉପଯୋଗୀ (ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିନ, ମୋତି/ମସ୍କୋଭି) ବଡ଼କ । ଅଣ୍ଡାଦିଆ ବଡ଼କମାନେ ୫-୬ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨ରୁ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଖାକି କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ବର୍ଷକୁ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଦେହର ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଖାକି କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ବଡ଼କ ଧୂସର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିନ୍-ଧଳା ତଥା ମୋତି/ମସ୍କୋଭି ଓ ଦେଶୀ ବଡ଼କର ରଙ୍ଗ କଳା-ଧଳା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଇଁ ଖାକି କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ଓ ଦେଶୀ ବଡ଼କ ଉପଯୁକ୍ତ ।

ବଡ଼କ ପାଳନ ପଦ୍ଧତି

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଳ୍ପ ବଡ଼କ ରଖି ବଡ଼କ ପାଳନର କୌଶଳ ଜାଣିବା ପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବଡ଼କ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର । ଖାକି କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ଓ ଦେଶୀ ବଡ଼କ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିନ ଓ ମୋତି/ମସ୍କୋଭି ବଡ଼କ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ବଡ଼କ ପାଳନର ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି :



ଖାକି କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍



ଦେଶୀ



ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିନ୍

ବତକ ଘର

୨୦-୩୦ଟି ବତକ ପାଇଁ ଘର ଅଗଣା ବା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ମାଟି ବା ନତା ଛପରଯୁକ୍ତ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ବତକ ପିଛା ୨ ରୁ ୩ ବର୍ଗ ଫୁଟ ହିସାବରେ ଚଟାଣ ରଖି ଏକ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର ଘରକୁ ୫-୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଛପର କରନ୍ତୁ । ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ବିପରୀତ କାନ୍ଥରେ ୨ ଟି ବଡ଼ ଝରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବତକ ମଲରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ତଥା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ (ଆମୋନିଆ ବାଷ୍ପ) ଦୂର କରିଥାଏ ।




ବତକ ଚିଆଁଙ୍କ ଯତ୍ନ

ଦିନିକିଆ ବତକ ଚିଆଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା କୈଣସି ସରକାରୀ ସାକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହ୍ୟାଟେରାରୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବା ଲବଣ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ବତକ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଫାସୁତୁରା ତଥା ଚୂନରେ ବିଶୋଧନ କରି ରଖନ୍ତୁ । ଦିନିକିଆ ବତକମାନଙ୍କୁ ୩-୪ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ରଖାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍‌ବ ଅଥବା ଲଣ୍ଠନର ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଦେହର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ । ବତକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଗଣାରେ ଜିଛି ସମୟ ଚଲାବୁଲା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଲ । କଟାସ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବତକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର । ବତକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ୨୦-୨୫ ଦିନ ପରେ ପୋଖରୀକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନ ହେଲେ ମାଟିରେ ଗାତ କରି ତଳେ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇ ଛୋଟ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ସବୁବେଳେ ସମାନ ବୟସର ବତକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ବତକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି

ଦାନାରେ ସମାନ ପରିମାଣର ପାଣି ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ବତକଙ୍କୁ ଗହମ, ମକା, ଚୋକଡ଼ ତଥା ତାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଓ ଚୋପା ସହିତ ପିତ୍ତିଆ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ବେଳେ ଭଲ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି । ପକ୍ଷୀଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିଥାଏ । ୨୦-୩୦ଟି ବତକ ପାଇଁ ପୋଖରୀରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ବଳକା ପନିପରିବା ଚୋପା, ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବତକ ଖାଉଥିବା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ପନିପରିବାକୁ ସିଝାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଅଣ୍ଡାଦେବା ସମୟରେ ବତକମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତୁଷ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନେ ମିଳିଥାଏ । ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବତକମାନଙ୍କୁ ପଥର ଚୂନ, ଶାମୁକା, ମାଛକାତି ଅଥବା ମାର୍ବଲ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବାରେ ମିଶାଇଲେ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳ ଟାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାର ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଆକାର ବଢ଼ିଥାଏ । ସବୁବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସଜ୍ଜ ପିଇବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ବତକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରାତିରେ ବା ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ ।

ସାବଧାନତା

ମକା ଥିବା ଦାନା ଅତି ପୁରୁଣା ହେଲେ ଅଥବା ପାଣିରେ ଭିଜି ରହିଲେ ଦାନା ଫିଙ୍ଗି ମାରିଯାଏ ଓ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଟକ୍ଲିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଫିଙ୍ଗିମାରିଥିବା ପୁରୁଣା କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ବତକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେଥିରେ ଥିବା ଆପ୍ଲାଟକ୍ଲିନ୍ ବତକରେ ପକ୍ଷପାତ ରୋଗ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଣ୍ଡାଦେବା ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତି ତଥା ମରିଥାନ୍ତି । ଦୁର୍ବଳ ତଥା ରୋଗୀଣୀ ବତକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖି ତାଙ୍କର ସତରଞ୍ଜ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ତଥା ନିକଟସ୍ଥ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ । ବତକ ଘର ଓ ତାର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣି କିମ୍ବା ଅନାବନା ଘାସ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବତକ ମଲକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍‌ଭାବେ ସଫା କରନ୍ତୁ । ମାଛ ବତକ ଅଣ୍ଡାଦେବା ଆରମ୍ଭକଲେ ଦଳରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡିରା ବତକମାନଙ୍କୁ (୧-୨ଟି ଛାଡ଼ି) ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ମାଛ ବତକଙ୍କୁ ପରିବେଶରୁ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ପାଇଥାଏ । ମାଛ ବତକ ଅଣ୍ଡାଦେବା ସମୟରେ ଦିନକୁ ୧୫ ରୁ ୧୬ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋକରେ ରହିବା ଦରକାର । ତେଣୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ୪ ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋକର ପ୍ରାବଧାନ କରାନ୍ତୁ । ଓସାରିଆ ମୁହଁଥିବା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବତକ ଘରକୋଣରେ ବସାଇଲେ ବତକମାନେ ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗେନାହିଁ ତଥା ମଇଳା ହୁଏନାହିଁ ।

ରୋଗ ପରିଚାଳନା

ବତକମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ତୁଳନାରେ ରୋଗ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । 'ଡକ୍ କଲେରା' ଓ 'ଡକ୍ ପ୍ଲେଗ' ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ । ଏହାଛଡ଼ା ପାଣିପାଗର ଅଥବା ଖାଦ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ପାଣି ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ନ ମିଳିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଘଟେ ।

'ଡକ୍ ପ୍ଲେଗ' ରୋଗରେ ବତକମାନଙ୍କର ଘନଘନ ପତଳା ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଝାଡ଼ା ହେବା ସହିତ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ।

