

କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୃତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ କିସମ ଫସଲର ପରିଲକ୍ଷିତ ଗୁଣାବଳୀ

ମନୀଷ ଚୌରସିଆ, ସୁଜାତା ସେଠୀ, ଶିବ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସାଦ,
ଦିଲ୍ଲୀପ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ
ଓଫିସ୍, କୋଟସାହି, କଟକ-୭୫୪୦୨୨
Email : kvkcuttack@gmail.com
Website : www.kvkcuttackzpdvii.org



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ
ଓଫିସ୍, କୋଟସାହି, କଟକ-୭୫୪୦୨୨
(ଭାକୃଅନୁପ - ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ)



ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟି :

ମନୀଷ ଚୌରସିଆ, ସୁଜାତା ସେଠୀ, ଶିବ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସାଦ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ-୨୦୧୬; କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୃତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ କିସମ ଫସଲର ପରିଲକ୍ଷିତ ଗୁଣାବଳୀ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା; ସଂପ୍ରସାରଣ ପୁସ୍ତିକା ସଂଖ୍ୟା -୦୧; ପୃଷ୍ଠା -୨୮

ସହଯୋଗ :

ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଲାଇ
ଅରବିନ୍ଦ ବିଶୋଇ

ପ୍ରକାଶକ :

ପ୍ରଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା

ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର :

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ

ପୁସ୍ତିକାର ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ଏହି ସବୁ କେବଳ ଅଣବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ।

ମୁଦ୍ରଣ :

ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ରେକ୍ ଅପ୍ରେଟ୍ ପ୍ରା.ଲିଃ.,
ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏରିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୨୪, ଓଡ଼ିଶା

କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୃତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ କିସମ ଫସଲର ପରିଲକ୍ଷିତ ଗୁଣାବଳୀ

ମନୀଷ ଚୌରସିଆ
ସୁଜାତା ସେଠୀ
ଶିବ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସାଦ
ଦିଲ୍ଲୀପ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତ
ବିଶ୍ୱନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ
ଉଚ୍ଚପଦା, କୋଟସାହି, କଟକ-୭୫୪୦୨୨
Email : kvkcuttack@gmail.com
Website : www.kvkcuttackzpdvii.org



ମୁଖବନ୍ଧ

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିବିଧ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ଚାଷଜମି ୧୮୮୧୫୦ ହେକ୍ଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଓ ସର୍ବାଧିକ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ । ଧାନ ଛଡା ଏହି ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକମାନେ ମୁଗ, ବିରି, ଚିନାବାଦାମ, ହରଡ଼ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଷୀମାନେ ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ରୋଗପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମନା କରିଥାନ୍ତି । ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମନା କରିବାକୁ କୃଷକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ବିହନର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ବିହନ ସାଧାରଣତଃ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବର୍ଷାଶିତ ଡିପ ଜମି ଅଞ୍ଚଳର କୃଷକ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଓ ଶଙ୍କର ବିହନ ସବୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଚାଷୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ବିହନ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ବିବିଧତା ବଜାୟ ରଖାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ପ୍ରକୃତିକୋଳରେ ବିକଶିତ ଏହି ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି କୃଷକ କିସମ ଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ‘ଉଦ୍ଭିଦ କିସମ ଓ କୃଷକ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ’ ନାମରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶୀ ଫସଲ ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଛି । କୃଷକମାନେ ଏହି ନିୟମ ସବୁକୁ ବୁଝି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶୀ ଫସଲ କିସମ ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି କିସମଗୁଡ଼ିକ ଗବେଷଣାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉପଯୋଗ ହେଲେ ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭାଂଶ ପାଇପାରିବେ ।

ଏହି ପୁସ୍ତିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହୃଦୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ । ଉଦ୍ଭିଦ କିସମ ଓ କୃଷକ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ପୁସ୍ତିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ । ସର୍ବୋପରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ଚାଷୀଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ଏହି ଦେଶୀ ବିହନ କିସମ ସବୁକୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସେସବୁର ଗୁଣାବଳୀ ସବୁକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ତିର କୃତଜ୍ଞ ।

“କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୃତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ କିସମ ଫସଲର ପରିଲକ୍ଷିତ ଗୁଣାବଳୀ” ପୁସ୍ତିକାଟିରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଯଥା ଧାନ, ତାଳି ଜାତୀୟ, ଡେଲିକାଜ ଜାତୀୟ ଓ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦିର ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ଏଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ଗୁଣାବଳୀ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗବେଷକ, ଛାତ୍ର, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ।

*ମନୀଷ ଚୌରସିଆ, ସୁଜାତା ସେଠୀ,
ଶିବ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସାଦ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ,
ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ*



ସୂଚୀପତ୍ର

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୃତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ କିସମ ଫସଲର ପରିଲକ୍ଷିତ ଗୁଣାବଳୀ	୦୪
କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ଦେଶୀ କିସମ ଏବଂ ଏହାର ଗୁଣାବଳୀ	୦୭
ଧାନ	୦୭
ମାଣିଆ	୧୪
ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ	୧୫
ତୈଳବାଜ ଫସଲ	୧୭
ପନିପରିବା ଫସଲ	୧୮
ଶାଗ ଜାତୀୟ ଫସଲ	୨୪



କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୃତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ କିସମ ଫସଲର ପରିଲକ୍ଷିତ ଗୁଣାବଳୀ

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଭୌଗୋଳିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରେ ଯେପରି ବିବିଧତା ରହିଛି, ସେହିପରି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ବିବିଧତାରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର । ଏହା ପୂର୍ବରେ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକା (୮୪° ୫୮' ରୁ ୮୬° ୨୦' ଅକ୍ଷାଂଶ) ଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ (୨୦°୦୩' ରୁ ୨୦°୪୦' ଦ୍ରାଘିମା) ସାତକୋଶିଆ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୧୫ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବାୟୁ ସାଧାରଣତଃ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦° ସେଲସିୟସ ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଋତୁରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୧୦° ସେଲସିୟସ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବର୍ଷା ପରିମାଣ ୧୫୦୧.୩ ମି.ମି ଅଟେ । ତେଣୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମତଳ ଓ ଖାଲୁଆ ଜମି ହେବା ସହିତ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଢିପଜମି ଏବଂ ଏସବୁ ଅଧିକତଃ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ଢିପଜମି ଅଟେ । ଯେହେତୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ବିବିଧ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ ଫସଲ କିସମକୁ ଗୁଣ୍ଡାକରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭଲି ଦୁର୍ବିପାକର ସାମନା କରିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ଦେଶୀ କିସମ ବିହନ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏଥିରୁ ଅମଳ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି ।

ଦେଶୀ କିସମ ଓ ଏହାର ଉପାଦେୟତା

ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ଗବେଷଣାଗାରରୁ ବିକଶିତ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଓ ଶଙ୍କର ବିହନ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ କାଳକ୍ରମେ ଦେଶୀ ବିହନ କିସମ ସବୁର ପ୍ରଚଳନ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି । ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆଜିମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶୀ କିସମ ଫସଲ ଗୁଣ୍ଡା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧାନ ଫସଲକୁ ନିଆଗଲେ ଦେଖାଯାଏ, ଗୁଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେପରିକି ଘରଛପର କରିବା, ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଛତୁଗୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମରୁଡ଼ି ଓ ବନ୍ୟା ସହଣୀଶକ୍ତି ଥିବା, ରୋଗପୋକ ସହଣୀଶକ୍ତି ଥିବା, ଔଷଧିଗୁଣ୍ଡା ଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶୀ ଧାନ ଗୁଣ୍ଡା କରାଯାଏ । ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ ବିହନ କିସମ ଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା

ଦେଖାଦେଇଛି । କୃଷକ ଅଧିକାର ଉପରେ ସରକାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଭିଦ କିସମ ଓ କୃଷକ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ - ୨୦୦୧ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜନନ ଓ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜନନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗଦାନକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଣିତ ଉଦ୍ଭିଦ କିସମ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ କିସମ ଏବଂ ପୁରାତନ ଗୁଣିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗି କୃଷକ ବା କୃଷିଜୀବି ମହିଳା ବା କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

ଦେଶୀ କିସମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉପାୟ

ଉଦ୍ଭିଦ କିସମ ଓ କୃଷକ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ - ୨୦୦୧ ର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରଜାତି ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣାମାନଙ୍କର ସତ୍ତା, ଆଲୋଚନା, ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଦେଶୀ କିସମ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ, ଦେଶୀ କିସମ ବିହନର ବିଶେଷ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କର୍ମଶାଳା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ ।


ଉଦ୍ଭିଦ କିସମର ଆନୁବଂଶିକ ସମ୍ବଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଦରକାରୀ ଅଟେ । ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗ କରି ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିବେ । ତେଣୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଯଥା ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, କଟକ ସଦର, ଟାଙ୍ଗୀ - ଚୌଦ୍ୱାର ଓ ତିରିରିଆ ର ଗୁଣାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁଣାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ଦେଶୀ କିସମ ଏବଂ ସେ ସବୁରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଗୁଣାବଳୀ ସବୁକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ଏହି ପୁସ୍ତିକାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗବେଷକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଏସବୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୁବ୍ ଉପାଦେୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ ଯଥା ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, କଟକ ସଦର, ଟାଙ୍ଗୀ- ଚୌଦ୍ୱାର ଓ ତିରିରିଆ ରେ ଗୁଣା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ କିସମ ଧାନ (୩୦ ପ୍ରକାର), ମାଣ୍ଡିଆ, ମୁଗ, ବିରି, ଚଣା, କୋଳଥ, ସୋରିଷ, ରାଶି, ପନିପରିବା ଯଥା ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଟି, ଶିମ୍ବ, ଲଙ୍କା, କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି, କଲରା, ଜହ୍ନି, ଶାଗ, କାଉଟି, ବିନ୍, ଧନିଆ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଏ ପୁସ୍ତିକାଟିରେ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ଦେଶୀ କିସମ ଏବଂ ଏହାର ଗୁଣାବଳୀ

ଧାନ

୧. ବାଙ୍ଗରାମାଧେଇ

ଏହି ଧାନର ଅବଧି ୧୨୫ ରୁ ୧୩୦ ଦିନ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିରେ ଗୁଣି କରାଯାଏ । ଶସ୍ୟର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହି ଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ କଳା ହୋଇ ଥିବାରୁ ବାଲୁକା ବାଛିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ରୋଗ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର ହରିଡ଼ା ପାଳ, ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାମର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଧାନର ଗୁଣକାରୀ ଭାଗ ଓ ପଖାଳ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।




୨. ବାଙ୍ଗୀ

ଏହାର ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୦ ଦିନ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଅଳ୍ପ ଖାଲୁଆ କିସମ ଜମିରେ ଗୁଣି କରାଯାଏ । ଶସ୍ୟର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହି ଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ରୋଗ ପୋକ ସହଣୀଶକ୍ତି ଅଧିକ । ଏହା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିରିଆ ବ୍ଲକର ତେନ୍ତୁଳିରଗଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଗୁଣାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି କରାଯାଇଥାଏ ।



୩. ବାକେସରୁଆ

ଫସଲ ଅବଧି ୧୪୫ ରୁ ୧୫୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଅଳ୍ପ ଖାଲୁଆ । ଶସ୍ୟର ପ୍ରକାର ଲମ୍ବା ଏବଂ ସରୁ । ଏହି ଧାନରୁ ଭଲ ମୁଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧାନକୁ ଦେଶୀ ମଦ ବା ହାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ତୁଳନାରେ ରୋଗ ଓ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର ହରିଡ଼ାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଧାନ ଗୁଣି କରାଯାଏ ।



୪. ବରସାଘଳି

ଫସଲ ଅବଧି ୧୩୦ ଦିନ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଅଳ୍ପପାଣିରେ ଗୁଣି କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ଧାନର ମରୁଡ଼ି ସହଣୀଶକ୍ତି ଅଧିକ । ଏହି ଧାନ ତିରିରିଆ ବ୍ଲକର ଗୁଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି କରାଯାଏ ।




୫) ଚମ୍ପେଇଶାଳୀ

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୦ ରୁ ୧୫୫ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲୁଆ ଜମି । ଏହି ଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ବନ୍ୟା ଜଳରେ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ରହିପାରେ । ଏହି ଧାନ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଓ ତେନ୍ତୁଳିରଗଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ରୁଷ କରାଯାଏ । ଏହି ଶସ୍ୟର ଆକାର ସରୁ ହୋଇଥାଏ ।



୬) ହଳଦିଗୁଣ୍ଡି

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୫ ରୁ ୧୬୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲୁଆ ଜମି । ଏହି ଶସ୍ୟର ଆକାର ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ବାସ୍ନାଧାନ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖିରି, ପିଠା, ପଲଉ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର ହରିତାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।



୭) ଜମ୍ବୁଦାପ

ଫସଲ ଅବଧି ୧୬୦ ରୁ ୧୬୫ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲୁଆ ଜମି । ଏହି ଶସ୍ୟର ଆକାର ଲମ୍ବା ଓ ସରୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ମୂଳ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ବାଲୁଙ୍ଗା ବାଛିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧାନର ରୋଗ ପୋକ ସହଣୀଶକ୍ତି ଅଧିକ । ଏହା ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର ହରିତାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




୮) ଝୁମୁଡ଼ି

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୫ ରୁ ୧୬୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲୁଆ ଜମି । ଏହି ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଧରଣର । ଏହାର ନଡ଼ା ଶକ୍ତ ଓ ମୋଟା ହୋଇ ଥିବାରୁ କୃଷକ ମାନେ ଏହାକୁ ଘର ଛପର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଧାନକୁ ସାଧାରଣତଃ ରୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ମ୍ବା, ତିଗିରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ଲକରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




୯) କଳାଜିରା

ଏହାର ଫସଲ ଅବଧି ୧୪୦ ରୁ ୧୫୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଅଳ୍ପ ଖାଲୁଆ । ଏହାର ଶସ୍ୟର ଆକାର ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟ ଧରଣର । ଏହା ଏକ ବାସ୍ନା ଧାନ ହୋଇଥିବାରୁ ରୁଉଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଖିରି, ପିଠା ଓ କାନିକା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




୧୦) କଣ୍ଠକଖାରୁଆ

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୫ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଅଳ୍ପ ଖାଲୁଆ । ଏହି ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଧରଣର । ଏହି ଧାନର ବନ୍ୟାଜଳ ସହଣୀଶକ୍ତି ଅଧିକ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡୁଥିବା ଜମି ସବୁରେ ରୁଷ କରାଯାଏ । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକରେ କୃଷକ ମାନେ ଏହି ଧାନ ରୁଷ କରିଥାନ୍ତି ।



୧୧) କସରା କଣ୍ଠା

ଫସଲ ଅବଧି ୧୨୫ ରୁ ୧୩୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ମଧ୍ୟ ଧରଣର । ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଧରଣର । ଏହି ଧାନର ନଡ଼ାର ଗୁଣବତ୍ତା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୃଷକ ମାନେ ଘର ଛପର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




୧୨) କୋଇଲିବାଇ

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୫ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲୁଆ ଜମି । ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଧରଣର । ଏହି ଧାନର ନଡ଼ା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବାରୁ ଘର ଛପର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




୧୩) ଅଗ୍ନିବାଣ

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୫ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲୁଆ ଜମି ଓ ଶସ୍ୟ ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହି ଧାନ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିପାରେ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ରେ ନଦୀ କୂଳ ଜମି ମାନଙ୍କରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




୧୪) ଚନ୍ଦ୍ରମଣି

ଫସଲ ଅବଧି ୧୨୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଜିପ ଜମି ଓ ଶସ୍ୟର ଆକାର ସରୁ । ଏହି ଧାନରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅରୁଆ ରୁଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସହିତ ପିଠା ଓ ଖିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହା ଟାଙ୍ଗୀ- ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ୍ରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




୧୫) କଳାଚମ୍ପା

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୫ ରୁ ୧୬୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲୁଆ ଜମି । ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଶସ୍ୟର ଓଜନ ଅପେକ୍ଷା-କୃତ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ରୁଷ କରିଥାନ୍ତି ।



୧୬) କୋଦାଭୂତିଆ

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୫ ରୁ ୧୬୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲୁଆ ଜମି । ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହି ଧାନ ଜମିରେ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାଜଳ ଜମି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଏହି ଧାନରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ରୁତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧାନକୁ ତିଗିରିଆର ରୁଷମାନେ ରୁଷ କରିଥାନ୍ତି ।



୧୭) କୋଳିଆଣ

ଫସଲ ଅବଧି ୯୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଜିପ ଜମି । ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହା କମ୍ ପାଣିରେ ଚାଷ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସହଣୀଶକ୍ତି ଅଧିକ । ଏଥିରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ରୁତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଥାଏ । ଏହି ଧାନକୁ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ୍ରେ ରୁଷମାନେ ରୁଷ କରିଥାନ୍ତି ।



୧୮) ଲଗୁଭୂତିଆ

ଫସଲ ଅବଧି ୧୩୫ ଦିନ । ଜମି କିସମ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ରୁତା ଏବଂ ଖଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରୁଷମାନେ ରୁଷକରିଥାନ୍ତି । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ରୁଷ ହୋଇଥାଏ ।



୧୯) ମଦନସୁନ୍ଦର

ଫସଲ ଅବଧି ୧୬୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲ ଜମି । ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହି ଧାନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଉଷୁନା ରୁଉଳ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ । ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଭିମାନପୁର ଗ୍ରାମର ରୁଷମାନେ ଏହି ଧାନ ରୁଷ କରିଥାନ୍ତି ।



୨୦) ମହିପାଳ

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଅଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ଜମି । ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହି ଧାନରୁ ଭଲ ଅରୁଆ ରୁଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ରୁଷ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଧାନ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ରେ ଖାରପଞ୍ଜା ଗ୍ରାମରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ରୁଷକରାଯାଏ ।



୨୧) ମୟୂରକଣ୍ଠା

ଫସଲ ଅବଧି ୧୪୫ ରୁ ୧୫୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଅଳ୍ପ ଖାଲ ଜମି । ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହି ଧାନରୁ ବାହାଘର ଓ ପୂଜାପାର୍ବଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଖଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ବୁକର ରୂପୀ ଭାଇ ମାନେ ଏହି ଧାନକୁ ରୂପ କରିଥାନ୍ତି ।




୨୨) ନାଲି ଅଳତା

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୦ ରୁ ୧୬୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲ ଜମି । ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହି ଧାନରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଖଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ବଡ଼ମ୍ବା ବୁକର ପଙ୍କାଳ ଗ୍ରାମର ରୂପୀଭାଇମାନେ ଏହି ଧାନକୁ ରୂପ କରିଥାନ୍ତି ।



୨୩) ନାଲି ଧୁସରା

ଫସଲ ଅବଧି ୧୬୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲ ଜମି । ଶସ୍ୟର ଆକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସରୁ ଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବାରୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଆଦୃତ । ଏହା ତିଗିରିଆ ବୁକରେ ରୂପ କରାଯାଏ ।




୨୪) ନାଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡି

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଅଳ୍ପ ଖାଲ ଜମି ଏବଂ ଶସ୍ୟର ଆକାର ଛୋଟ ଓ ମୋଟା । ଏହାର ରୁଢ଼ଳ ସାଧାରଣତଃ ପଲଉ, କାନିକା, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ବୁକରେ କୃଷକ ମାନେ ରୂପ କରିଥାନ୍ତି ।



୨୫) ପାଣିକାଟି

ଫସଲ ଅବଧି ୧୬୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲ ଜମି ଏବଂ ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହି ଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ଧାନ ଜମିରେ ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଗଛ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଏହି ଧାନ ବଡ଼ମ୍ବା ବୁକର ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୂପ କରାଯାଏ ।




୨୬) ରଙ୍ଗଶିଉଳି

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୦ ରୁ ୧୬୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲ ଜମି । ଶସ୍ୟର ଆକାର ସରୁ । ଏହା ଖଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧାନ ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ବୁକରେ ରୂପ କରାଯାଇଥାଏ ।




୨୭) ସରୁଚିନା

ଫସଲ ଅବଧି ୧୩୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଶସ୍ୟର ଆକାର ସରୁ । ଏହାର ରୂପ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ମରୁଡ଼ି ସହଣୀଶକ୍ତି ରହିଛି । ଏହା ଟାଙ୍ଗୀ- ଚୌଦ୍ୱାର ଓ କଟକ ସଦର ବୁକର କୃଷକ ଭାଇମାନେ ରୂପ କରିଥାନ୍ତି ।




୨୮) ସଲିତମ୍ପା

ଫସଲ ଅବଧି ୧୩୫ ଦିନ । ଜମି କିସମ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହି ଧାନର ମରୁଡ଼ି ସହଣୀଶକ୍ତି ରହିଛି । ଏହା ତିଗିରିଆ ବୁକରେ ରୂପ କରାଯାଏ ।



୨୯) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି

ଫସଲ ଅବଧି ୧୨୦ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଢିପ ଜମି ଓ ଶସ୍ୟର ଆକାର ସରୁ । ଏହାର ମରୁଡ଼ି ସହଣୀଶକ୍ତି ଅଧିକ ଏବଂ ଏଥିରେ ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ବୁକରେ ରୂପ କରାଯାଏ ।



୩୦) ତୁଳସୀବାସ

ଫସଲ ଅବଧି ୧୫୦ ରୁ ୧୫୫ ଦିନ । ଜମି କିସମ ଖାଲୁଆ ଜମି । ଶସ୍ୟର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହା ଏକ ବାସ୍ନା ଧାନ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏହାର ରୁଢ଼ଳକୁ ଖିରି ଓ ପାୟସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ବୁକର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୂପ କରାଯାଏ ।



କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୃତ ଦେଶୀ ଧାନ କିସମର ନାମ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଗୁଣବତ୍ତା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଧାନ କିସମର ବିଶେଷ ଗୁଣବତ୍ତା	କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୃତ ଦେଶୀ ଧାନ କିସମର ନାମ
୧.	ମରୁଡ଼ି ସହଣୀଶକ୍ତି	ବରଷା ଘଳି, କଲିଆଣ, ସରୁଚିନା, ସଲିଚମ୍ପା, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି
୨.	ବନ୍ୟାଜଳ ସହଣୀଶକ୍ତି	ଅଗ୍ନିବାଣ, ଚମ୍ପେଇଶାଳୀ, କଣ୍ଠାକଖାରୁଆ, କୋଦାଭୂତିଆ, ପାଣିକାଟି
୩.	ଘାସ ବା ବାଲୁଙ୍ଗା ବାଛିବା ନିମନ୍ତେ ସହଜ (କଳାମୂଳ)	ବାଙ୍ଗରମାଧେଇ, ଜମ୍ବୁଦୀପ
୪.	ରୋଗ ପୋକ ସହଣୀଶକ୍ତି	ବାଙ୍ଗର ମାଧେଇ, ବାଙ୍ଗି, ଜମ୍ବୁଦୀପ, ରଙ୍ଗ ଶିଉଳି, ବାଙ୍କେସରୁଆ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି
୫.	ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ପାୟସ, କାନିକା, ଖିରି ପ୍ରସ୍ତୁତି	ମଦନ ସୁନ୍ଦର, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ମହିପାଳ, ନାଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡି, ନାଲିଧୂସରା
୬.	ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଥା ମୁଡ଼ି, ଖଇ, ରୁଡ଼ା, ଦେଶୀ ମଦ ଇତ୍ୟାଦି	ଲଗୁଭୂତିଆ, ବାଙ୍କେସରୁଆ, ମୟୂରକଣ୍ଠା, ନାଲି ଅଳତା, ରଙ୍ଗଶିଉଳି, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି, କୋଦାଭୂତିଆ, କଲିଆଣ
୭.	ବାସ୍ନା ଧାନ	କଳାଜୀରା, ତୁଳସୀବାସ, ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡି
୮.	ଲମ୍ବା ଓ ଶକ୍ତ ନଡ଼ା	କସରାକଣ୍ଠା, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି, କୋଇଲିବାଇ

ମାଣ୍ଡିଆ

ମାଣ୍ଡିଆ


ଫସଲ ଅବଧି ୧୨୦ ଦିନ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଡିପ ଜମିରେ ରୁଷ କରାଯାଏ । ଏହାର ରୁଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ବୁକର ପଙ୍କାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।



ଡ଼ାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ

୧) ଦେଶୀ ଚଣା

ଫସଲ ଅବଧି ୧୨୦ ଦିନ ଓ ହାରାହାରି ଅମଳ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରକୁ ୧୨ ରୁ ୧୩ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ । ଡ଼ାଲି ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ । ଏହା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




୨) ବତୁଆ ଚଣା

ଫସଲ ଅବଧି ୯୦ ଦିନ । ଏହା ଆକାରରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




୩) ବଡ଼ ଚଣା

ଫସଲ ଅବଧି ୯୦ ଦିନ । ଏହା ଡ଼ାଲି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




୪) ଦେଶୀ ବିରି

ଫସଲ ଅବଧି ୯୦ ଦିନ । ଏଥିରେ ରୋଗ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା, ବରା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏହି ବିରି ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା, ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର, କଟକ ସଦର ଆଦି ବୁକରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।



୫) ଦେଶୀ ମୁଗ

ଫସଲ ଅବଧି ୮୦ରୁ ୯୦ ଦିନ । ଏହି ମୁଗରେ ରୋଗ ସହଣୀଶକ୍ତି ରହିଛି । ଏହା ଡାଲି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏହା ଡିଗିରିଆ, ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର, ମାହାଙ୍ଗା, ସାଲେପୁର ଓ କଟକ ସଦର ଆଦି ବ୍ଲକରେ ରୂଷ କରାଯାଏ ।



୬) କଳା କୋଳଥ

ଫସଲ ଅବଧି ୯୦ ଦିନ । ଏହାର ରକ୍ଷନ ଗୁଣବତ୍ତା ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏହାର ଔଷଧିୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଫସଲରେ ରୋଗ ପୋକ କମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ଝାଙ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୂଷ କରାଯାଏ ।




୭) ଦେଶୀ କୋଳଥ

ଫସଲ ଅବଧି ୭୦ରୁ ୯୫ ଦିନ । ଏହି ଡାଲି ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏହା କମ୍ ପାଣି ଦରକାର କରିଥାଏ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସହଣୀଶକ୍ତି ରହିଛି । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା, ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ଲକରେ ରୂଷ କରାଯାଏ ।



୮) ବରଗୁଡ଼ି

ଫସଲ ଅବଧି ୯୦ ଦିନ । ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଡାଲି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାର ରକ୍ଷନ ଗୁଣବତ୍ତା ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏଥିରେ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୂର୍ଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।



୯) କାଉଟି

ଏହାର ଫସଲ ଅବଧି ୯୦ ଦିନ । ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହା ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହା ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । କଅଁଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ପରିବା ହିସାବରେ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଶୁଖିବା ପରେ ଡାଲି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୂଷ କରାଯାଏ ।



ତୈଳବାଜ ଫସଲ

ଦେଶୀ ସୋରିଷ (୧)

ଫସଲ ଅବଧି ୪୫ରୁ ୫୦ଦିନ । ଏହି ମଞ୍ଜିର ଆକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଏବଂ ତେଲ ଧଳା ରଙ୍ଗର । ଏହା ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୂଷ କରାଯାଏ ।




ଦେଶୀ ସୋରିଷ (୨)

ଫସଲ ଅବଧି ୯୦ ଦିନ । ଏଥିରେ ରୋଗ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୂଷ କରାଯାଏ ।



ଦେଶୀ ରାଶି


ଫସଲ ଅବଧି ୯୦ରୁ ୯୫ଦିନ । ଏହାର ରୋଗ ପୋକର ସହଣୀଶକ୍ତି ଅଧିକ । ରୂଷ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ମରୁଡ଼ି ସହଣୀଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା, ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ଲକରେ ରୂଷ କରାଯାଏ ।



ପନିପରିବା ଫସଲ


ଦେଶୀ ବାଇଗଣ

ଗୁରା ରୋଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଫଳଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ରଙ୍ଗର । ଏହା ଡିଗିରିଆ ଓ ବଡ଼ମ୍ବା ବୃକ୍ଷରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




ବେଲୁଆ ବାଇଗଣ

ଏହି ବାଇଗଣର ଆକାର ଖୁବ୍ ବଡ଼ । ଏହାର ରକ୍ଷନ ଗୁଣବତ୍ତା ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ । ଏଥିରେ ମଞ୍ଜି କମ୍ ଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହାର ଗୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହାର ଅମଳ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳିଥାଏ । ଏହା ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ବୃକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




କଣ୍ଠେଇମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ

ଏହି ବାଇଗଣର ପତ୍ର ଓ ଫଳରେ କଣ୍ଠା ରହିଥାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲାକାର ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର । ଏହାର ରକ୍ଷନ ଗୁଣବତ୍ତା ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ । ଗୁରା ରୋଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ଠାରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଋଷୀଭାଇ ମାନେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହାର ଗୁରା ରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାର ରୋଗ ସହଣୀଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବାଇଗଣର ଚାହିଦା ଅଧିକ ।




ଦେଶୀ ଭେଣ୍ଡି (୧)

ଏହି ଭେଣ୍ଡିର ଆକାର ବଡ଼ ଓ ଅମଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ । ଏହି ଭେଣ୍ଡିରେ ସାହେବୀ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ବଜାର ଚାହିଦା ଖୁବ୍ ଭଲ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ବୃକ୍ଷର ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।



ଦେଶୀ ଭେଣ୍ଡି (୨)

ଗଛ ୪୫ ଦିନର ହେବା ପରେ ଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ସାହେବୀ ରୋଗର ସହଣୀଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ବୃକ୍ଷର ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।



ନାଲି ଭେଣ୍ଡି

ଏହି ଭେଣ୍ଡିର ଫଳଗୁଡ଼ିକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ରୁଚିଦା ରହିଥାଏ । ଏହି ଭେଣ୍ଡି ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏହା ନରସିଂହପୁର, ବଡ଼ମ୍ବା ଓ ଡିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।



ଦେଶୀ ବିନ୍

ଏହାର ଫସଲ ଅବଧି ୪୫ ଦିନ । ଏହା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ୩୦ ଦିନରେ ଏହି ଫସଲ ରୁଷ କରାଯାଏ । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନରସିଂହପୁର ଓ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ରେ ଏହି ବିନ୍ ରୁଷ କରାଯାଏ ।

ତୋଡ଼ିଶିମ୍ବ

ଗଛ ଲାଗିବାର ତିନିମାସ ପରେ ଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଶିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ସରୁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ । ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ଓ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଶିମ୍ବରେ ରୋଗପୋକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାର ରନ୍ଧନ ଗୁଣବତ୍ତା ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏହା ନରସିଂହପୁର, ବଡ଼ମ୍ବା ଓ ତିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।



ଚଣି ଶିମ୍ବ

ଏହା ଛୋଟ ଆକାରର ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର । ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଶିମ୍ବରେ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।



ତଳ ମୁହଁ ଲଙ୍କା

ରୁଆ ରୋଇବାର ୪୫ ଦିନ ପରେ ଏହି ଲଙ୍କାରେ ଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ୨୪୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲଙ୍କାର ରୁହିଦା ଭଲ ରହିଥିବାରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ରୁଷୀ ଏହାକୁ ରୁଷ କରିଥାନ୍ତି ।



କୋଳି ଲଙ୍କା

ରୁଆ ରୋଇବାର ୪୫ ଦିନ ପରେ ଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୫୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଲଙ୍କା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଲଙ୍କା ଖୁବ୍ ରୁଚିକର ଏବଂ ଏଥିରେ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।



ଦେଶୀ ଲଙ୍କା

ଏହି ଲଙ୍କାର ବଜାର ରୁହିଦା ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ଅମଳ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଲଙ୍କାରେ ରୋଗ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।




ଜାଡ଼ କଖାରୁ

ଜାଡ଼ କଖାରୁ ସାଧାରଣତଃ ରବି ଋତୁ ବା ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏହି ଫସଲ ୧୨୦ ଦିନର । ଏହାର ଫଳର ଆକାର ବଡ଼ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଫଳର ଓଜନ ହାରାହାରି ୨୦ ରୁ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ରହେ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ।



ଗଣ୍ଡି କଖାରୁ

ଗଣ୍ଡି କଖାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗୁଣ କରାଯାଏ । ଗଛ ଲଗାଇବାର ୯୦ ରୁ ୧୦୦ ଦିନ ପରେ ଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଫଳର ଓଜନ ହାରାହାରି ୬ ରୁ ୮ କି.ଗ୍ରା. ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ରକ୍ତନ ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ।



ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି

ଗଛ ଲଗାଇବାର ୪୫ ରୁ ୫୦ ଦିନ ପରେ ଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଫଳର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର । ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏହା କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ।



କଣ୍ଠିଆଳି କାକୁଡ଼ି

ଗଛ ଲଗାଇବାର ୪୫ ଦିନ ପରେ ଫଳ ଆସିଥାଏ । ଏହା ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଫଳର ଉପର ଅଂଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଠି ରହିଥାଏ । ଏହାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ।



ରଞ୍ଜା କଲରା

ମଞ୍ଜି ଲାଗାଇବାର ୪୫ ଦିନ ପରେ ଏହି କଲରା ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି କଲରା ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜୁଲାଇ ମାସ ଠାରୁ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ।




ଦେଶୀ କଲରା ବା ଚୁସି କଲରା

ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏଥିରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଆକାର ଛୋଟ ଓ ପିତା ଅଂଶ କମ୍ ଥାଏ । ଏହା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏହି କଲରାର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ତୋଳିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ।



ଥୋଳି ଜହ୍ନି

ଗଛ ଲାଗାଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଫଳର ଆକାର ଛୋଟ ଏବଂ ଅମଳ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏହା ଗୋଟିକିଆ କିମ୍ବା ପେନ୍ଥାରେ ଫଳିଥାଏ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ।



ଦେଶୀ ଜହ୍ନି

ଫଳର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ । ବଜାର ଗୁଣିଦା ଭଲ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଅମଳ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ରୋଗପୋକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଉତ୍ତମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହା ଗୁଣ କରାଯାଏ । ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ।



ଶାଗ ଜାତୀୟ ଫସଲ


କୋଶଳା ଶାଗ

ଏହି ଶାଗ ବୁଣିବାର ୪୦ ରୁ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏହା କଟକ ସଦର, ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର, ତିରିରିଆ ଓ ବଡ଼ମ୍ବା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।



ନାଲି କୋଶଳା

ଏହି ଶାଗ ବୁଣିବାର ୩୦ ରୁ ୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଅମଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଶାଗ ସାଧାରଣତଃ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ଏହା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।



ଦେଶୀ ଧନିଆ

ଗଜା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାର ୨୧ ଦିନ ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ୯୦ - ୧୧୦ ଦିନ ପରେ ଫଳ ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ । ବଡ଼ମ୍ବା ବୁଲର ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ବିଶେଷଭାବେ ଏହି ଦେଶୀ ଧନିଆ ରୁଷ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ।

