

## କୃଷି ସୂଚନା ସେବା (ଧାନ)

ଉତ୍ତରପ୍ରଦୀପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅଞ୍ଚଳୀୟ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

### ୨୦୧୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାଯାର୍ଡପଣ୍ଡା :

- ❖ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ରୋଇବାର ଏଠା ଦିନ ପରେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଯବନ୍ଧାରଜାନ ସାର (ଏକର ପିଛା ୨୨ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ଯୁରିଆ) ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଚାସ ସାର ଶେଷ କିଣ୍ଠି ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ଶଙ୍କର କିସମ ଧାନରେ ଅନୁମୋଦିତ ଯବନ୍ଧାରଜାନ ଏବଂ ପଚାସ ସାରର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶୟୁରିଆ ଏକର ପିଛା ୨୬ କି.ଗ୍ରା. ଏବଂ ପଚାସ ସାର ଏକର ପିଛା ୧୦ କି.ଗ୍ରା.) ଶେଷ କିଣ୍ଠି ସାର ଭାବରେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜମିରେ ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଶେଷ କିଣ୍ଠି ଯବନ୍ଧାରଜାନ ସାର ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ❖ ଏହି ପକ୍ଷରେ କାଣ୍ଡବିଦ୍ଧା ପୋକର ପ୍ରାର୍ଦ୍ଧଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏହାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୌନ ସଂବେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରା ବସାନ୍ତୁ ଅଥବା ନିଜେ ବୁଲାବୁଲି କରି ତାର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ । ଏହା ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମାରୁଏକ ବର୍ଗମିଟରରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟାପୁଞ୍ଜ କିମ୍ବା ୧-୨ ଟି ପ୍ରଜାପତି କିମ୍ବା ଦିନକୁ ପ୍ରତି ଯନ୍ତାରେ ୪-୫ ଟି ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତି କିମ୍ବା ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ୧-୨ ଟି ମଞ୍ଜକିଳା) ଅଧିକା ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାଟନାଶକ ଔଷଧରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

କ୍ଷେତ୍ରାନ୍ତାନ୍ତିକିପ୍ରୋଲ ୧୮.୫ ଏସ.ସି.୨୦ ମି.ଲି./ଏକର କିମ୍ବା

ଗ୍ରାୟାଜୋପସ୍ ୪୦ ଇ.ସି. ୫୦୦ ମି.ଲି./ଏକର କିମ୍ବା

କ୍ଷେତ୍ରାନ୍ତାନ୍ତିକିପ୍ରୋଲ ୨୦ ଇ.ସି. ୫୦୦ ମି.ଲି./ଏକର ।

ସର୍ବଦା ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ହିସାବରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । କେବଳ ମଞ୍ଜକିଳା ଦେଖାଦେଲେ ଦାନାଦାର ଔଷଧ ଯଥା କାର୍ବୋଫ୍ଲୁରାନ୍ (୩ ଜି) ଏକର ପିଛା ୧୨ କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା କାରଚାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଷେତ୍ରାନ୍ତାନ୍ତିକିପ୍ରୋଲ (୪ ଜି) ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

- ❖ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ, ଧଳା ପତ୍ରତିଆଁ ପୋକ, ପତ୍ରମୋଡା ପୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଦ୍ଧଭାବ ଅଧିକ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

ପତ୍ରମୋଡା ପୋକ - ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୧ ରୁ ୨ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପତ୍ର ,

ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ - ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୫-୧୦ ପୋକ,

ଧଳା ପତ୍ରତିଆଁ ପୋକ - ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୫-୧୦ ଟି ପୋକ ।

ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋକ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୋକମରା ଔଷଧରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ, ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପଡ଼ମୋଡ଼ା ପୋକ - ତ୍ରୟାକୋପର୍ସ ୪୦ ଲ.ସି. ୨୫୦ ମି.ଲି./ଏକର କିମ୍ବା

ଆୟୋମିଥୋକ୍ତାମ୍ ୨୫ ଡିବ୍ୟ. ଜି ୪୦ ଗ୍ରାମ/ଏକର କିମ୍ବା

ନିମଟେଲ ୫ ମି.ଲି/ଲିଟର ପାଣିରେ ଶତକତା ୨ ଭାଗ ସାବୁନ ପାଣି ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ବାଦାମୀ ଗୁଡ଼ିପୋକ / ଧଳା ପଡ଼ଦିଆଁ ପୋକ / ସବୁଜ ପଡ଼ଦିଆଁ ପୋକ -

ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ ୧୩.୮ ଏସ.୬ଲ ୫୦ ମି.ଲି./ଏକର କିମ୍ବା

ଆୟୋମିଥୋକ୍ତାମ୍ ୨୫ ଡିବ୍ୟ. ଜି ୪୦ ଗ୍ରାମ/ଏକର କିମ୍ବା

ଇଥୋଫେନ୍‌ପ୍ରକ୍ର ୧୦ ଲ.ସି. ୨୦୦ ମି.ଲି./ଏକର କିମ୍ବା

ନିମଟେଲ ୫ ମି.ଲି/ଲିଟର ପାଣିରେ ଶତକତା ୨ ଭାଗ ସାବୁନ ପାଣି ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

**ବ୍ର.ଦ୍ରୁ:** ବାଦାମୀ ଗୁଡ଼ି ପୋକ/ଧଳା ପଡ଼ଦିଆଁ ପୋକର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାନ ଗଛର ମୂଳକୁ ଗୋଟିଏ ବାତି ଦ୍ୱାରା ବାତେଇ ଦେଲେ ପୋକଗୁଡ଼ିକ ପାଣିକୁ ତେଇଁ ପଡ଼ିବେ । ସେଥିରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଦ୍ଧଭାବ ଜାଣିପାରିବା

- ❖ ମହିଷା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ କାରବେଣ୍ଟାଜିମ୍ ୫୦ ଡିବ୍ୟ. ପି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା  
ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜଲ ୨୫ ଡିବ୍ୟ. ପି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୨ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବାଦାମୀ ପଡ଼ ଚିତା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମ୍ୟାଙ୍କୋଜେବ  
ଅଥବା ୧ ମି.ଲି. ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏଥୁସହିତ ପଚାସ ସାର ଅତିରିକ୍ତ  
କିଷି ଭାବରେ ଏକର ପିଛା ୨ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ (ମ୍ୟୁରେଟ ଅଫ୍ ପଚାସ ୧୦ କି.ଗ୍ରା./ଏକର)  
ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

\*\*\*\*\*