

କୃଷି ସୂଚନା ସେବା (ଧାନ)

ଡା.କୃ.ଆନ୍ତୁ.ପ.-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

୨୦୭୦ ମସିହା ମାର୍କ ମାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର :

- ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ରୋଇବାର ୨୦ ଦିନ ପରେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଏକ ଚତୁର୍ଥଂଶ ଯବନାରଜାନ ସାର (ଆର୍ଥିକ ଏକର ପିଛା ୨୧ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ଘୁରିଆ) ଶେଷ କିଣି ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ଶଙ୍କର କିସମ ଧାନରେ ଅନୁମୋଦିତ ଯବନାରଜାନ ଏବଂ ପଚାସ ସାରର ଏକ ଚତୁର୍ଥଂଶ (ଆର୍ଥିକ ଘୁରିଆ ଏକର ପିଛା ୨୭ କି.ଗ୍ରା. ଏବଂ ପଚାସ ସାର ଏକର ପିଛା ୧୦ କି.ଗ୍ରା.) ହିସାବରେ ଶେଷ କିଣି ସାର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡ ପୋକ ଉପରୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶେଷ କିଣି ଯବନାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହିସାବରେ, ଯଦି ମାର୍କ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ଉପରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ମହିକ୍ଷାରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇଯିବ । ଯଦି ମହିକ୍ଷା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଗ୍ରାଇଫ୍ଲେକ୍ୟୁଷ୍ଟ୍ରିବିନ୍ ସହିତ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ (ବାନ, ବିମ) ୦.୪ ଗ୍ରାମ ଏକ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବାଦାମୀ ପଡ଼ୁ ଚିତା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନ୍କୋଯେବ୍ କିମ୍ବା ୨୦୦ ମି.ଲି. ପ୍ରେପିକୋନାଜୋଲ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏଥୁସହିତ ପଚାସ ସାର ଅତିରିକ୍ତ କିଣି ଭାବରେ ଏକର ପିଛା ୭ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ (ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅପ୍ ପଚାସ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ଏକର) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- କାଣ୍ଡାବିନ୍ଧା ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୁଆ ଧାନରେ ଏକର ପିଛା ୩ଟି ହିସାବରେ ଯୌନ ସମେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରା ରଖନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯନ୍ତ୍ରା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୪ ଟି ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏକର ପିଛା ଗ୍ରାଇକୋଗାମା ଜାପେନିକମ୍ ପରଭୋଜୀ ପୋକର ୨୦,୦୦୦ ଅଣ୍ଟା (ଆର୍ଥିକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇକୋକାର୍ଟ) ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତରରେ ତିନିଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା ନିଯମ ମଞ୍ଜିରୁ ଚିଆରି ଔଷଧ ଯଥା ଆଜାତିରାକ୍ଷିନ୍ ୦.୧୫% କୁ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ରୁ ୮୦୦ ମି.ଲି. ଔଷଧ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା କ୍ଲୋରାନ୍‌ଟ୍ରାନ୍ସିଲିପ୍ରୋଲ ୪% ଜି.ଆର ୪ କି.ଗ୍ରା.କୁ ୪ କି.ଗ୍ରା. ବାଲି ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନ୍‌ଟ୍ରାନ୍ସିଲିପ୍ରୋଲ ୧୮.୫% ଏସ.ସି ୨୦ ମି.ଲି. ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା କାର୍ଗ୍‌ପ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ ଜି. ୧୦ କି.ଗ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ ୩% ୧୦ କି.ଗ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
