

କୃତି ସ୍ଵରୂପ ଏବା (ଧାର)

ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ.- ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭,

୭୦୭୦ ମସିହା ମର ମାସର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି

ଗ୍ରୀବାରତୁରେ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ିଯାଉଛି ହେବାଦ୍ୱାରା ରୁଷ କାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ । ରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷପ ନେବାପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

- ଏହି ସମୟରେ କେଣ୍ଟାର ମୂଳରେ ମହିଷା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଯଦି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏକର ପିଛା ଆଜ୍ଞାୟିଷ୍ଟାବିନ୍ ୨୫ ଏସ.ସି. ୨୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା କାର୍ବେଣ୍ଟାଜିମ୍ ୪୦ ଡବ୍ୟୁ.ପି. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇପ୍ଲୋୟିଷ୍ଟାବିନ୍ ୨୫% ସହିତ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% ଟ୍ରୋକୋନାସ୍ଟାର୍ପ୍ଲୁରୋସେନ୍ସ ଲିଟରରେ ୫ ମି.ଲି. ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ହତୀତ ଗରମ ପଢ଼ିଲେ ବାଦାମୀ ଗୁଡ଼ିପୋକର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିପାଇଁ ମୁହାଏ । ଯଦି ଧାନ ବିଳରେ ବୁଦା ପିଛା ୧୦ ଟିରୁ ଅଧିକ ପୋକ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଏକର ପିଛା ଟ୍ରାଇପ୍ଲୁମେଜୋପାଇଚିମ୍ ୧୦ ଏସ.ସି., ୯୪ ମି.ଲି. କିମ୍ବା
ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ୍ ୫୦ ଡବ୍ୟୁ.ଜି, ୧୨୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା
କ୍ଲୋଥିଆନ୍ତିନ୍ ୫୦ ଡବ୍ୟୁ.ଜି ୧.୭ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା
ତିନୋଟେପ୍ଲୁରାନ୍ ୨୦ ଏସ.ଜି. ୭୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା
ପ୍ଲୋକିକାମିଡ୍ ୫୦ ଡବ୍ୟୁ.ଜି ୭୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା
- ପାଥ୍ରର ସ୍ତରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହାର ନୋଇଲ ଗଛର ମୂଳକୁ ଦେଖେଇ ସ୍ତର କରନ୍ତୁ । ସକାଳ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ।
- ଧାନ ଫୁଲ ଉତ୍ତାଇବା ସମୟରେ ଗଣ୍ଡିପୋକ ଦେଖାବେଇପାରନ୍ତି । ଗଣ୍ଡିପୋକର ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସାମା ହେଲା ବୁଦାପ୍ରତି ୨ଟି କିମ୍ବା ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି ୪ଟି ପୋକଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସାମାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଏକର ପିଛା ମାଲାଥୁଅନ୍ ୫% ୧୦ କି.ଗ୍ରା ଗୁଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଇଥୋଫେନୋପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୦ ଲ.ସି. ୨୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିପ୍ରସ୍ଟ ୨୦ ଲ.ସି. ୧ ଲିଟର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ପାଚିଲା ସମୟରେ କେଣ୍ଟା କଟା ସଂବଲୁଆ ଦେଖାଦେଲେ କୁଇନାଲପ୍ସ ୨୫ ଲ.ସି. ୪୦୦ ମି.ଲି. ଏକର ପିଛା କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିପ୍ରସ୍ଟ ୨୦ ଲ.ସି. ୪୦୦ ମି.ଲି. ଏକର ପିଛା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଚିଗଲେ କାଟିଦିଅଛୁ (ଶତକତା ୮୦ ଭାଗ ପାଚିବା ଦରକାର) । ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ କାଟିଲେ ଖରାଟିଆ ଧାନ ହେଉଛି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକଥାଏ ।

- ବର୍ଷାଶୀତ ଖାଲ ଜମିରେ ସିଧା ବୁଣୀ ପାଇଁ ଖରାଟିଆ ଗୁଷ୍ଟ କରିଦିଅଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ମୋଡ଼ା ଲଙ୍ଘଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଥମେ ଗୁଷ୍ଟ କରିଦିଅଛୁ । ଏହା ଫଂଳରେ ମାଟିର ୧୫-୨୦ ସେ.ମି. ଗଭାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଷ୍ଟ କଳଟିଭେଟର ବ୍ୟବହାର କରି କରନ୍ତୁ ।
- ଯେଉଁଠାରେ ହାଲୁକା ମାଟି ଅଛି ସେଠାରେ ରୋଟାଭେଟରରେ ଗୁଷ୍ଟ କରି ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
- ମଧ୍ୟମ ଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ ବର୍ଷାଧାନ, ଦୁର୍ଗା, ସି.ଆର.ଧାନ ୪୦୧, ହଂସେଶ୍ଵରୀ ଏବଂ ଶାରଳା କିସମର ଧାନ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ ସି.ଆର.ଧାନ ୪୦୨(ଜଳମଣି), ସି.ଆର.ଧାନ-୪୦୩ (ଜୟତୀ ଧାନ), ସି.ଆର.ଧାନ ୪୦୦ ଏବଂ ସି.ଆର.ଧାନ ୪୦୪ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଉତ୍ତମ ଗୁଣାମୂଳକ ମାନର ବିହନ, ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(କୃଷି) ଡାକ୍ ଭଲ ବିହନ ଉପାଦନ କରୁଥିବା ଫାର୍ମରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ରୁଆ ଧାନ ଗୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧନିରୁ ବିହନ ଉପରୋକ୍ତ ମୁନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅଛୁ ।
