



ധോ. സംഖിത ശ്രീവദാസൻ,
ധോ. ഷിനോജ് സുരേഷ് ബാബു

63 രു കോഴിക്കുള്ള സ്ഥലത്ത്
8-10 കാടകൾ വളർത്താം. ഒരു
കാടയ്ക്ക് ദിനംപ്രതി 25 ഗ്രാ. തീറ്റ് മതി.
ആറ്റച്ചപ്രായമാകുമ്പോൾ മുട്ടയ്ക്കു
തുടങ്ങുന്ന കാടയിൽനിന്ന് വർഷ
തിരിൾ ശരാശരി 10 ഗ്രാ. ഭാരമുള്ള 280
മുതൽ 300 വരെ മുട്ട ലഭിക്കും. 5-6
ആഴ്ചപ്രായമായതിൽ 150 ഗ്രാ. ശരിരംഭാരം
വർഷക്കുന്ന കാടയുടെ മംസത്തിനും
നല്ല പിപണിയാണ്. രോഗബാധ തീരെ
യില്ല.

കാടമുട്ടയിലും ഇരുച്ചിയിലും കോ
ഴിയുടെതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുടുതൽ
മാംസ്യം, വൈറ്റ്മിൻ, കാർബിഡ്, ഫോ
സ്പാസ് തുടങ്ങിയ ലഘാജാലുമും
ഉം. കാടമുട്ടയും ഇരുച്ചിയും ശാസ
കോശ രോഗങ്ങൾക്ക് അധികാരിക്കുന്നു.

കുട്ടാരുകുഡോൾ

ഓട്, ഓല, ആന്റ് ബൊസ്റ്റോൺ എന്നി
വകാംകു മേൽക്കൂര നിർമ്മിച്ച ഒപ്പ്
യെഡുകളിൽ വളർത്താം. 15-20 ഡിഗ്രി
സെൽഷ്യൂസ് ചുട്ടും 40-70 ശതമാനം
ഇംഗ്ലൂഡുള്ള ഷൈഡ്യുകളാണ് ന
ല്ലാത്. ഷൈഡ്യുകളക്കുള്ളിൽ തുറന്നു
വിട്ടോ, പ്രത്യേകം ചെറുകുടുകളിൽ
അടച്ചും 500 കാടകൾവരെ ആദ്യായക
രംധരി വളർത്താം. വീടിനോടു ചേർ
ന്ന് ചാൽപ്പുപോലെയോ മട്ടപ്പോവിൽ
ഷൈഡ്യു എന്നും സിൽവോളിൻ ഷീറ്റും
ഉപയോഗിച്ചോ ഷൈഡ്യു നിർമ്മിക്കാം.

നുറു കാടകൾക്ക് ഏഴ് അടി നീളം
വും മുന്ന് അടി വീതിയും. ഒരടി ഉയരം
വുമുള്ള കുടു മതി. 500 കാടകൾ ഇ
തുപോലുള്ള അഥവാ കുടുകൾ തുടു
കളായി ഓനിനുമുകളിൽ മറ്റാന്നാ
യി ക്രമീകരിച്ച് കോളനി രിതിയിൽ
വളർത്താം. രണ്ട് തട്ടുകൾക്കിടയിൽ
6-8 ഇംബ് (15-20 സെ.മീ.) അകലം ഉ
ണ്ണായിരിക്കണം. ഓരോ തട്ടുകിൽ
ലും. വിസർജ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ
ടേ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷിറ്റ് വർ
ക്കണം. അടിഭാഗത്ത് 1.25 സെ.മീ.
(അരയിബ്ബ്) സമചതുരത്തിലുള്ളതും
മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ 7.5 X 2.5 സെ.മീ. ചതുര
തിലുള്ളതുമായ കമ്പിവല ഉപയോ
ഗിച്ചാണ് കുടുകൾ തയാറാക്കേണ്ടത്.
ഒരു കാടയ്ക്ക് 150-200 പ.സെ.മീ.
സ്ഥലം. മതിയാകും. തീറ്റ് നൽകാൻ
നാല് ഇംബും വെള്ളം. നൽകുന്നതിനാ
യി മുന്ന് ഇംബും വ്യാസമുള്ള ഒന്നു
കെ പകുതിയായി പിളർന്ന പിവിസി
പെപ്പുക്കാഷണങ്ങൾ രണ്ടുവും. അടച്ച്
കുടിരേണ്ട് പുറത്ത് വശങ്ങളിൽ ലഭി
പ്പിച്ചും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു
കാടയ്ക്ക് 2-3 സെ.മീ. ഏന്ന നിരക്കി
ലാണ് പെപ്പുകളുടെ നീളം കണക്കാ



അനായാസം ആദായം

കോഴിവളർത്തലിനെ അപേക്ഷിച്ച് എളുപ്പവും ചെലവും
കുറഞ്ഞതുമാണ് കാട് വളർത്തൽ

ക്രോട്ടെറ്.

തീറ്റുക്കും

പ്രത്യേകം കാടത്തിറ്റ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ
ഇരുച്ചിക്കോഴിക്ക് നൽകുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ,
ഫിനിഷർ തീറ്റുകളിൽ ഓരോ 100
കിലോ തീറ്റയിലും രണ്ട് കിലോ മീൻ
പൊടിയും. അഞ്ചു കിലോ കപ്പലണ്ണി
പ്രിണ്ടൂക്കും. ഏട്ടു ഗ്രാ. ജീവകം, ‘ഇ’
പൊടിയും. ചേരുത സ്റ്റാർട്ടർ (0-3
ആഴ്ചപ്രായമുള്ളവയ്ക്ക്), ഫ്രോവർ
(3-6 ആഴ്ചപ്രായമുള്ളവയ്ക്ക്) തീറ്റ
ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാം. തീറ്റയിൽ
കക്കാപ്പൂടി ചേരുതു നൽകിയാൽ
നല്ല തോട്ടുള്ള മുട്ട ലഭിക്കും. തീറ്റയിൽ
22% മാംസ്യവും, 2650 കിലോ കലോറി
ഉംജാവും. വേണാ. ശുഭജലം. 24 മൺ
ക്കുറു. ഉറപ്പുവരുത്തണം.

പ്രത്യുൽപാദനം

ശരാശരി 7-8 ആഴ്ചപ്രായത്തിൽ മു
ട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും. 17-26 ആഴ്ചപ്രായ
തിരിൽ മുട്ടയുൽപാദനം. പാരമുത്തി
ലെത്തുന്നു. മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ
മുട്ടയുടെ ഭാരം 8 ഗ്രാമിൽ തുടങ്ങി 13.5
ഗ്രാ. വരെ ആകും. പെസ്റ്റികാക്കുകൾ
16 മൺക്കുറ വെളിച്ച്. നൽകുന്നത്
മുട്ടയുൽപാദനത്തിന് ഉത്തരജകം.
ഒന്നത് പ. മീറ്റർ സ്ഥലത്തെതക്ക് 40
വാട്ട് ബർഡ്ബോം ട്യൂബോ മതി.

പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് 10 മുതൽ
23 ആഴ്ചപ്രവര പ്രായമുള്ള പിടകൾ
ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ടോ മുന്നോ പിട

കൾക്ക് ഒരു പുവൻ എന്ന അനുപാത
ത്തിൽ ഇംഗ്ലോചേരാൻ പ്രത്യേകം തയാ
രാകിയ കുട്ടിൽനിന്നു കൊത്തുമുട്ട്
ശേഖരിക്കാം. മുടകൾ കൃതിമമാ
യോ അടക്കോഴിയെല്ലാം ഉപയോഗി
ച്ചു വിരിയിക്കാം.

ചെലവു കുറഞ്ഞ ഇൻകൃപ്പുഡോ
ററുകൾ ഇംപ്രോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യ
മാണ്. ഇൻകൃപ്പുഡോററിൽ ആദ്യത്തെ
14 ഡിഗ്രി. 37.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യൂസ്
ചുട്ടും 60 ശതമാനം ഇംപ്രോൾ ക്രമി
കൾക്കാണ്. തുടർന്നുള്ള 2-4 ഡിഗ്രി.
36.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യൂസ് ചുട്ടും 70
ശതമാനം. ഇംപ്രോൾ ക്രമികൾക്കാണ്.
വിത്തെന്തിരാങ്ങുന്ന കുത്തുങ്ങൾക്ക്
മുന്നാഴ്ചയെല്ലാം കൃതിമച്ചുട്ട് ഉറ
പുവരുത്തി പ്രത്യേക പരിക്കൈ നൽക
ണം. ആദ്യത്തെ ആഴ്ച 37.5 ഡിഗ്രി
സെൽഷ്യൂസ് ചുട്ട് നൽകാം. ക്രമേണ

എല്ലാ ആഴ്ചയിലും. മുന്നു ഡിഗ്രി സെ
ൽഷ്യൂസ് ചുട്ട് കുറിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന്
മുന്നാമത്തെ ആഴ്ചപ്രായയിലേക്ക് കൊ
ണ്ടുവരണം. തുടർന്ന് ഇവയെ വിപ
ണിയിലെത്തിക്കാവുന്നതാണ്. കു
ത്തുങ്ങൾക്കു ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു
തട്ടിൽ ഇംഗ്രേസിലും ചെയ്യാം. കു
ത്തിമമായി ചുട്ട് നൽകാം 100 കുത്തു
ങ്ങൾക്ക് 60 വാട്ടിന്റെ രണ്ടു ബഡ്ബോം
അബ്ലൈറ്റിൽ 275-300 കുത്തുങ്ങൾക്ക്
250 വാട്ടിന്റെ ഒരു ഇൻഗ്രോബർ ബൾ
ബോം ഉപയോഗിക്കാം.

അദ്യത്തെ ആഴ്ചപ്രയിൽ ബ്രൂസി
ന് ചുട്ടും ചിക്ക് ശാർഡ് വർക്കുന്നത്
നല്ലതാണ്. 3-4 ആഴ്ചപ്രായമെത്തു
വേണാം തന്നെ ആണ്-പെസ് കാട
കുള്ള വേർത്തിരിക്കാം കഴിയും. ആ
ണിനു പെസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് വല്ല
പു. കുറവാണ്. ആണിനു കഴുതിലും
നെണ്ണിലും ചുവപ്പും തവിട്ടും കലർന്ന
തുവല്ലുകളുണ്ട്. പെസ്റ്റിനു മുഖം ഭാഗത്ത്
കുറപ്പും പുള്ളികളുണ്ടായി ചാരനിറ
മുള്ളും തുവല്ലുകളാണുള്ളത്. ഒരു വർക്ക്
പു. മുട്ടയിട്ടിനും ശേഷം. ഇരുച്ചിക്കായി
വിൽക്കുകയും. ശേഷം. ചുതിയ കാട
കുള്ള വാങ്ങുന്നതുമാണ് നല്ലത്.

വിലാസം: കൃഷി വിജ്ഞാന
കേന്ദ്രം, കസ്റ്റത്തുബന്ധ സർക്കാർ, കടവല്ല
പോസ്റ്റ്, കെട്ടാം-682 020.

ഫോൺ: 0484-2317752
ഇമെയിൽ: kvkernakulam@cmfri.org.in