



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 18 अक्टूबर 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	19/10/18	20/10/18	21/10/18	22/10/18	23/10/18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	37	37	36	36	35
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	18	18	18	17	17
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	1	1	0	1	2
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	74	76	75	79	81
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	12	14	15	18	19
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	8	7	5	6	8
हवा की दिशा	पश्चिम	पश्चिम	पूर्व- दक्षिण-पूर्व	पूर्व	पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
सरसों/राया	बुवाई	पूसा सरसों-25, पूसा सरसों-26, पूसा सरसों-27, एन.आर.सी.एच. बी-101, सी.एच-52, टी-59, आर.एच-30, बायो-902, जी.एम-2 व आर.एच-819 सरसों की उन्नत किस्में हैं। सफेद रोली रोग के प्रकोप से बचाने के लिए बीज को मेटालेक्सिल 35 एस.डी 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर उपचारित करें। बुवाई के समय 30 किलो नत्रजन व 30 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर की दर से दें।
चना	बुवाई	सी-235, आर.एस.जी-44, आर.एस.जी-888, आर.एस.जी-896, जी.एन.जी-1488, आर.एस.जी-974, जी.एन.जी-1958 व जी.एन.जी-663, चने की उन्नत किस्में हैं। बीज को कार्बेण्डेजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। 20 किलो नत्रजन व 25 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर की दर से बुवाई के समय दें।
लहसुन	बुवाई	लहसुन की बुवाई हेतु यमुना सफेद, लावा व मलेवा उन्नत किस्में हैं। बुवाई हेतु 5 कुन्तल कलियां प्रति हैक्टेयर के लिए पर्याप्त है।
रिजका बरसीम व जई		रिजका, बरसीम व जई की बुवाई का उचित समय है। जावी-8, ओ.एल-9, ओ.एल-529 व केन्ट, डी.एफ.ओ-57 जई की उन्नत किस्में हैं। आन्नद-2, एल.एल.सी-3, टाईप-9 व सिरसा-8 रिजका की उन्नत किस्में हैं। मसकावी व वरदान बरसीम की उन्नत किस्में हैं।

(नौडल ऑफीसर)