

കിബോൾ

ഒരു റിഞ്ചറാലു പച്ചക്കറി കൂഷ്ഠി

ഇലതീനിഷുപ്തവിനെതിരെ എസ്.എ.എസ്.പി.വി. 1.5 ശ്രീലി ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി 35 ദിവസം ഇടവേ ഉകളിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കെ.വി.കെയിൽ ലഭ്യമായി ടുഷ്ട് നിം സോപ് 2.5 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി 10 ദിവസതെത്തു ഇടവേളകളിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കവുന്നതാണ്.

കാബേജ്ജിൽ കാണപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനായി സ്വീഡോമോണാസ് 5 ശ്രീലി ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി 15 ദിവസം ഇടവേളകളിൽ സൈപ്പേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.

തയ്യാറാക്കിയത്
ആഷിവ എ
സബ്ജോക്സ് ചാറ്റർ സെപ്പെഷ്യലിറ്റു് (അരേഗ്രാണചി)
ICAR കൃഷി വിജ്ഞാനകേന്ദ്രം
ശാന്തൻപാറ, ഇടുക്കി



ICAR-Krishi Vigyan Kendra

Hosted By: Bapooji Sevak Samaj
Farm Science Centre, ICAR Govt. of India
Idukki Dist
Pethotty, P.O, Santhanpara, Idukki, Kerala, Pin: 685619
Phone: (04868) 247541, 247715
Email: kvksanthanpara@gmail.com
Website: www.kvkidukki.org



കാബേജ്

രൂ ശിതകാവ് പച്ചക്കറി കൃഷി

കേരളത്തിൽ ഒക്കാബർ മുതൽ ജൂനുവർ വരെയുള്ള തസുപ്പുള്ള മാസങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന പച്ചക്കറിയാണ് കാബേജ്. ഉയർന്ന മുഴപ്പട്ടപ്രദേശങ്ങളിൽ ജുണി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ കാലയളവും കൃഷിക്ക് അനുഭയാജു മണം.

കാബേജ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് കാലാവസ്ഥയും സമയവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാബേജ്ഞിൻ്റെ അന്തരഗാനത്ത് ഇലകൾ കുടിച്ചേർന്ന് തോളാകുതിയിലുണ്ടാകുന്ന ഫല്ലിയാണ് പച്ചക്കറിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ രൂപ പെടുന്ന സമയത്തെ താപനില ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒക്കാബർ മാസമാണ് വിളവിന് നല്ലത്. തെക്കൻ നടുന്നതിന് കാലതാഴ്സം വന്നാൽ വിളവ് ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.

വിത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ച തെക്കളാണ് നടവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിത്തുകൾ പാക്കുന്നതിനായി ഒന്നര ഇഞ്ച് ആഴത്തിലുള്ള ഫ്രോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഫ്രേയിലേക്ക് ചകിരിക്കുന്നുണ്ട് വെർബിക്കുലൈറ്റ് പെർലൈറ്റ് എന്നിവ 3:1:1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ കുടിച്ചേർത്ത ശിൽിനും നിരച്ച് ഒരോ വിത്തു വിത്തം ഒരോ കുഴിയിൽ പാവുക. ഇതിന് പകരം ചെറിയ തവാരണകളിലും വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ച് എടുക്കാം. നട്ട് 25 ദിവസം മുഴ് എത്തിയ തെക്കൾ പരിച്ച് നടാവുന്നതാണ്.

കൃഷിക്ക് നല്ല സുരൂപ്രകാശവും നന്നവും ഉള്ള സ്ഥലം അണി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. രൂ സെറ്റിന് 2.5 കിലോ കുമ്മായം/ഡോം ചെരുക്കാൻ പ്രയോഗം ആണ്.

രെടി വീതിയും രെടി ഉയരവുള്ള ബണ്ടുകൾ രെടി അകലപ്പത്തിൽ എടുക്കണം. ഇതിൽ 45 സെറ്റിമീറ്റർ അകല തയിൽ തെക്കൾ നടണം. രൂ സെറ്റ് നടുന്നതിനായി 148 തെക്കൾ വേണം. നട്ട തെക്കളുടെ ഇലകൾ മണിൽ ചുട്ടാൽ ദിക്കാൻ പ്രയോകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

നട്ട് പത്ത് ദിവസം പ്രായമാക്കുമ്പോൾ ആഴത്തെ വള്ള പ്രയോഗം ചെയ്യാം. സെറ്റിന് 1.2 കിലോഗ്രാം യുറിയ, 2 കിലോഗ്രാം രാജ്ഞിപ്പൊസ്റ്റ്, 800 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ് എന്ന തോതിൽ കലർത്തി ചെടിയൊന്നിന് 15 മുതൽ 20 ഗ്രാം വീതം ചെർത്ത് കൊടുക്കണം. വള്ളപ്രയോഗത്തിന് മുന്ത് കളകൾ പരിച്ച് കളയണം. വള്ളപ്രയോഗം മുന്നാംതെത്തയും, അഞ്ചാംതെത്തയും ആഴ്ചപ്രയിൽ ആവർത്തിക്കുകയും വേണം. വള്ളപ്രയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെടിയുടെ കടകൾ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ട് വള്ള ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

സുക്ഷ്മ മുലകങ്ങളുടെ ശ്രീറിത്തായ ഐ.എ.എച്ച്. ആർ വെജ്ജിറ്റബിൽ സ്പെഷ്യൽ 5ഗ്രാം രൂ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി ഇലകളിൽ മുന്ത് തവണകളിലായി തളിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പരിച്ച് നട്ട് 25-30 ദിവസം ആകുമ്പോൾ ആഴ്ച സ്പേസ് കെടുക്കുക. പിന്നീട് 20-25 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ രെംബാംതെത്തയും മുന്നാംതെത്തയും സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

മുന്നാംതെത്ത ആഴ്ച മണിൽ കണ്ണാസ്റ്റ് കടല പിണ്ണാക്ക്, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് തുടങ്ങിയ ജൈവവളങ്ങൾ ചെടിയൊന്നിന് 25ഗ്രാം വീതം ചെർത്ത് മണിൽ കയറ്റി കൊടുക്കണം പുളിപ്പിച്ച ജൈവവളങ്ങൾ നേർപ്പിച്ച് തളിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

കാബേജ്ഞിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡയമണ്ട് ബാക്കിംഗാൽ എന്ന കീടത്തെ ചെറുകുവാൻ കെ വി കെയിൽ ലഭ്യായ ഈ പി എൻ 2ഗ്രാം രൂ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി 15 ദിവസം ഇടവേളകളിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സ്പീസേഡ് 0.5മില്ലി ലിറ്റർ രൂ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി 25 ദിവസം ഇടവേളകളിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക.