

ಹಿಮ್ಮನೀರಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಳ-ಜೊನ್ ದುಂಡಾಳ ಸವಾರಣೆ

ಹಿಮ್ಮನೀರಳಿಗೆ ಗಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ವಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಳ - ಜೊನ್ ದುಂಬಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತಿದ್ದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗೆ ಕೋಲ್‌ಲಾರ, ಮಂಡ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮನೀರಳಿಗೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾನಿ ವಾಡುತ್ತಿದ್ದು ರೇಪ್ ಬೆಳ್ಗಾರರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮೀಸಿದೆ.

ಪೌಧಾವಸ್ಯಂ ದುಂಬಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮನೀರಳಿಗೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಗುಂಪಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಡದ ಎಳಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲದೆ ಗೆಣ್ಣಿ / ಕಳ್ಳಿನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 9 ರಿಂದ 10 ದುಂಬಿಗಳು ಒಂದೇ ಹಿಮ್ಮನೀರಳಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ದುಂಬಿಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚನ ಪ್ರವಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಧಿತವೆ. ಸೋಂಬಿನೆ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ 1೨.೨೫ರಷ್ಟು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಳ - ಜೊನ್ ದುಂಬಿಗಳನ್ನು ಕಾಕ ಚಾಪ್ಪರ್ ದುಂಬಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದ್ದು. ವ್ಯಾಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೊಲೋಟ್ರೈಕೆಲ್ಯ ಸೆರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಬಿಂದು ಕೊಡಲೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದೆ



ಹೊರ ಬಂದು ಹಿಮ್ಮನೀರಳಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದುಂಬಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಆಸರ್ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದರೆ ಬೇವು, ಕಾಡು ಪೆಪಾಯು, ಕೆಕ್ಕಿ ಬೆಂಡೆ, ಅಲಸಂದೆ, ಎಲಚಿ ಗಿಡ, ಗುಲಾಬಿ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲು.

ಮೇಳ-ಜೊನ್ ದುಂಬಿಯ ಬೇವನ ಚಕ್ರ ಮಾಟ್ಟಿ: ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ದುಂಬಿಯ ಸುಮಾರು 800-1000 ವೊಟಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಣಿನಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಸೆ.ಎಂ. ಆಳದಲ್ಲಿ

ಇಡುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೊಳು ಬೆಳಿ ಬಣದಲ್ಲಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿರಾಯ 12 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೊಳು ಒಡೆದು ವುರಿ ಹುಳುಗಳು ಹೊರಬುತ್ತವೆ.

ಮರಿಕೆಳು ಹಂತ: ಗೊಣಹುಳುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಬ್ಬಿ, ತೆಂಗು, ನೆಲಗಡಲೆ, ಹುಲ್ಲು ಶಾಖಾದಿಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲನೆ ಹಂತ: 30-40 ದಿನಗಳು, **ಎರಡನೆ ಹಂತ:** 150-160 ದಿನಗಳು, **ಮೂರನೆ ಹಂತ:** 110-120 ದಿನಗಳು ಮರಿಹುಳುಗಳು ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಂಡು ಅಥವಾ ಕಾಮು ಬಣ್ಣದ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಬ್ಬಿ, ತೆಂಗು ಇತರೆ ಬೆಳ್ಗಳ ಬೇರನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡುಕುತ್ತವೆ.

ಕೋಶಾವಸ್ಥೆ: ಇವು ಮತ್ತೊಂದೆ ಸುಮಾರು 90-110 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೋಶಾವಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಪೌಧಾವಸ್ಥೆ: ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಬಿಂದು ಕೊಡಲೇ ದುಂಬಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದೆ ಹೊರಬರುವ ಇವು ನಿಶಾಚರಿಗಳಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮ್ಮನೀರಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಸರ್ ಸಸ್ಯಗಳಾದ ಹಲಸು, ಬೇವು, ಆಕೆಸಿಯಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತವೆ.



ಮೇ-ಜೂನ್ ದಂಬಿಗಳು ತನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಒಂದು ವೆಷ್ಟ್ ಕ್ಷಮ್ಮನೆಳಿಸುತ್ತದೆ.


ನಿರ್ವಹಣ್ಣ ಕ್ರಮಗಳು:

1. ರೇಪ್ ಬೆಳೆಗಾರರು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮನೇರಳೆ ಹೊಟಕ್ಕೆ ಭೋಟೆ ನೀಡಿ ಹೆಚು ಬೆಳೆ ಕು ಬೆಲ್ಲುವ ಟಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಳಿಸಿ ಸೂಪು ತಿನ್ನತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಥ್ಮ ದಂಬಿಗಳನ್ನು ಗೋಣೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೀಮೆವಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿತ ನೀರಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ (1:50) ಹಾಕಿ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸುದುವುದು.
2. ಬೆಳಿನ ಟ್ರೈಪೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಕಿಡೆಟೆಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಥ್ಮ ದಂಬಿಗಳನ್ನು ಸೀಮೆವಾಕ್ಕೆಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ (1:50) ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು.
3. ಸಂಜೀ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಬೇವಿನ ಮರದ ರಂಬೆಗೆಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮನೇರಳೆ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಬೇವಿನ ರಂಬೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಕಿಡೆಟೆಗೊಂಡ



4. ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ದಂಬಿಗಳ ಹುಳುವಿನ ಹಂತವನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೂ

5. ಹಿಮ್ಮನೇರಳೆ ತೋಟ ಕಟ್ಟಾವಾದ 20 ದಿನಗಳೇ ಒಳಗೆ ಬೇವಿನ ಮರದ ರಂಬೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.0.25ರ ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೆರಿಪಾಸ್ (ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2.5



ದಂಬಿಗಳನ್ನು ಗೋಣೆ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು.

ಕೀಟಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಸಹ ತಾಯ್ಯು ತಿನ್ನಲಿಡುತ್ತವೆ.



ಎಂ.ಎಲ್) ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಿಮ್ಮನೇರಳೆ ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬೇವಿನ ಸೂಪುನ್ನು ತಿಂದಂತಹ ದಂಬಿಗಳು ಸಾಯ್ಯಿತವೆ.

6. ಹಿಮ್ಮನೇರಳೆ ಕಟ್ಟಾವಾಗಿ 20 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ದ್ವಾರ್ಪಿಲ್ಲಿ ದಂಬಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶೇ. 0.15 ಪ್ರಮಾಣದ ದಿಡಿ.ಡಿ.ಡಿ.ಎ.ಎ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು (2 ಮಿ.ಆರ್. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು 1 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ) ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.

— ಡಾ. ಶತಧರ್, ಕೆ.ಪಿ.ಎ.
ಡಾ. ಸಾಗರಾಜ ಕೆ.ಮಾ.ಎ.
ಡಾ. ಸೂರ್ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಾರಂ
ಪಾನಾರ್ಥ್ರಾ-ಕ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕೊಂಡು